

۱- کدام گزینه جزو کرومپروتئین ها می باشند؟

۱. هموگلوبین ۲. سیتوکروم ها ۳. فلاووپروتئین ها ۴. هر سه گزینه

۲- روش های کلدال و ون سوست به ترتیب برای اندازه گیری کدام بخش از مواد خوراکی استفاده می شود؟

۱. رطوبت-حاکستر خام ۲. چربی خام-بخشهای فیبر خام ۳. پروتئین خام-بخشهای فیبر خام

۳- اسید های چرب فرار که در نتیجه تخمیر در شکمبه تولید می شوند کدامند؟

۱. اسید استیک، اسید پروپیونیک، اسید لاکتیک ۲. اسید سیتریک، اسید سوکسینیک، اسید پیروویک ۳. اسید استیک، اسید پروپیونیک، اسید بوتیریک

۴- در شرایط فیزیولوژیک، به ترتیب گلوکز و فروکتوز اساسا به چه شکلی دیده می شوند؟

۱. پیرانوز خطی و فورانوز خطی ۲. پیرانوز حلقوی و فورانوز حلقوی ۳. پیرانوز خطی و فورانوز حلقوی

۵- کدام ترکیب زیر، در واقع یک کربوهیدرات نیست ولی همیشه همراه کربوهیدراتها یافت می شود و سبب کاهش هضم کربوهیدراتها می شود؟

۱. رافینوز ۲. آرابینوز ۳. پکتین ۴. لیگنین

۶- اسید چرب غالب در شیر نشخوار کنندگان ،کدام است؟

۱. بوتیریک و کاپروئیک ۲. کاپریک و کاپریلیک ۳. بوتیریک و استئاریک ۴. کاپرویک و کاپریک

۷- کدام جمله صحیح است؟

۱. بیشتر چربی جیره نشخوار کنندگان اشباع ولی بیشتر چربی بدن آنها غیر اشباع می باشد.
۲. بیشتر چربی جیره نشخوار کنندگان غیر اشباع ولی بیشتر چربی بدن آنها اشباع می باشد.
۳. بیشتر چربی جیره و چربی بدن نشخوار کنندگان اشباع می باشد.
۴. بیشتر چربی جیره و چربی بدن نشخوار کنندگان غیر اشباع می باشد.

www.nashr-estekhdam.ir

۸- اسیدهای صفراوی، هورمون های غدد فوق کلیه و هورمون های جنسی جزو کدام دسته از ترکیبات می باشند؟

۱. اسفنگومیلین ها ۲. سفالین ها ۳. آمید ها ۴. استروئید ها

۹- کدام جمله درست است؟

۱. ایزومرهای D و L کربوهیدرات ها به یک میزان فعالیت متابولیکی دارند.
۲. ایزومرهای D و L آمینواسیدها به یک میزان فعالیت متابولیکی دارند.
۳. ایزومر L آمینواسیدها در مقایسه با ایزومر D فعالیت متابولیکی بالاتری دارند.
۴. ایزومر L کربوهیدرات ها در مقایسه با ایزومر D فعالیت متابولیکی بالاتری دارند.

۱۰- به چه علت آرژنین در پرندگان جزو آمینو اسیدهای ضروری می باشد؟

۱. زیرا پرندگان فاقد چرخه اوره می باشند.
۲. زیرا جذب آرژنین از کلیه های طیور بسیار کم است.
۳. زیرا بازجذب آرژنین از کلیه های طیور بسیار کم است.

۱۱- چرا کاروتون ها و ویتامین A بسیار مستعد اکسیداسیون هستند؟

۱. به علت وجود زنجیره هیدروکربنی کوتاه و پیوندهای اشباع
۲. به علت وجود زنجیره هیدروکربنی طویل و پیوندهای اشباع
۳. به علت وجود زنجیره هیدروکربنی کوتاه و پیوندهای غیر اشباع
۴. به علت وجود زنجیره هیدروکربنی طویل و پیوندهای غیر اشباع

۱۲- نرمی استخوان بر اثر چه عاملی به وجود می آید؟

۱. کمبود ویتامین D
۲. کمبود Ca و P
۳. عدم تعادل بین نسبت Ca به P
۴. همه موارد

www.nashr-estekhdam.ir

۱۳- مهمترین علامت کمبود ویتامین E چیست؟

۱. کاهش بینایی
۲. کم خونی
۳. تحلیل ماهیچه ای (میوپاتی)
۴. بهبود کند زخم ها

۱۴- هنگام تشکیل پوسته تخم مرغ، کدام رخداد می تواند سبب اسیدوز ملایم در مرغ شود؟

۱. هنگام تشکیل کربنات کلسیم، H^+ تولید می شود.
۲. هنگام تشکیل کربنات کلسیم، H^- مصرف می شود.
۳. هنگام تشکیل کربنات کلسیم، Cl^- تولید می شود.

۱۵- در مورد دو بیماری ریکتز و استئومالاسی کدام گزینه صحیح است؟

۱. ریکتز در حیوانات بالغ و استئومالاسی در حیوانات جوان رخ می دهد.

۲. کمبود ویتامین D نیز می تواند باعث بروز علائم ریکتز و استئومالاسی شود.

۳. کمبود فسفر می تواند باعث بروز علائم ریکتز و استئومالاسی شود.

۴. گزینه های ب و ج

۱۶- کدام ماده معدنی زیر به عنوان بخش مهمی از ویتامین B₁₂ و سیتوکروم ها بوده و برای جذب از روده نیاز به پروتئین آپوفرتین دارد؟

Cu . ۴

Fe . ۳

Mg . ۲

Ca . ۱

۱۷- در مورد اثر کاتالیزور کدام جمله صحیح است؟

۱. کاتالیزور، انرژی فعال سازی برای آنزیم را کاهش می دهد.

۲. کاتالیزور، انرژی فعال سازی آنزیم را افزایش می دهد.

۳. کاتالیزور، انرژی فعال سازی آنزیم را ابتدا کاهش و بعداً افزایش می دهد

۴. هیچکدام

۱۸- منظور از زایموژن چیست؟

۱. گروه های غیر پپتیدی که برای فعالیت بعضی از آنزیمهها نیاز است.

۲. شکل فعال آنزیم های پروتئاز

www.nashr-estekhdam.ir

۳. شکل غیرفعال آنزیم های پروتئاز

۴. شکل غیرفعال آنزیم های کربوهیدرات

۱۹- میکروارگانیسم های موثر در هضم شکمبه ای نشخوارکنندگان از چه نوعی هستند؟

۴. همه موارد

۳. پروتوزوآها

۲. قارچ ها

۱. باکتری ها

۲۰- محل اصلی جذب مواد مغذی کجاست و به ترتیب از چه بخش هایی تشکیل شده؟

۱. روده بزرگ، دودنوم، ژوژنوم و ایلئوم

۲. روده کوچک، دودنوم، ژوژنوم و ایلئوم

۳. روده بزرگ، ژوژنوم، دودنوم و ایلئوم

۲۱- کدام آنزیم در پستانداران وجود دارد اما در طیور وجود ندارد؟

۴. الف و ب

۳. لاکتاز

۲. فسفاتاز

۱. آمیلاز

۴۲- در هنگام استفاده از اوره به عنوان منبع ازت غیر پروتئینی، سطح کربوهیدرات‌های سهل‌الهضم جیره باید چگونه باشد؟

۱. پایین

۲. بالا

۳. ادرصد کل کربوهیدرات‌های جیره

۴. بین مقدار مصرف اوره و سطح کربوهیدرات‌های سهل‌الهضم جیره ارتباطی وجود ندارد

۴۳- ماده اولیه سنتز هورمون تیورکسین کدام اسید آمینه است؟

۱. سرین

۲. آلانین

۳. گلایسین

۴. تیروزین

۱. اسیدآرشیدونیک

۲. اسید پالمیتیک

۳. اسید لینولئیک

۴. اسید لینولنیک

۱. آمینو اسیدها و لاکتان

۲. بوتیرات

۳. پروپیونات

۴. استات

۱. مهمن

۲. ترین

۳. سرین

۴. تیروزین

۴۴- عمدۀ ترین اسید چرب خروجی از شکمبه کدام است؟

۱. اسیدآرشیدونیک

۲. اسید پالمیتیک

۳. اسید لینولئیک

۴. اسید لینولنیک

۴۵- مهم ترین منبع تامین کننده گلوکز خون در نشخوارکنندگان کدام است؟

۱. آمینو اسیدها و لاکتان

۲. بوتیرات

۳. پروپیونات

۴. استات

۴۶- محصول نهایی تجزیه نشاسته در شکمبه و روده نشخوارکنندگان به ترتیب کدام است؟

۱. گلوکز-اسیدهای چرب فرار

۲. گلوکز-گلوکز

۳. اسیدهای چرب فرار-اسیدهای چرب فرار

۴. اسیدهای چرب فرار-گلوکز

۴۷- **Mobile nylon bag technique** (تکنیک کیسه نایلونی متحرک) به چه منظوری به کار می‌رود؟

۱. فقط برای اندازه گیری قابلیت هضم مواد در روده
www.nashr-estekhdam.ir

۲. فقط برای اندازه گیری قابلیت هضم مواد در معده

۳. فقط برای اندازه گیری قابلیت هضم مواد در شکمبه

۴. برای اندازه گیری قابلیت هضم مواد در قسمت‌های مختلف دستگاه گوارش

۲۸- افزایش چربی جیره غذایی چه تاثیری بر رشد میکرووارگانیسم های هضم کننده سلولز در شکمبه دارد؟

۱. بی تاثیر است.

۲. باعث کاهش آن می شود.

۳. باعث افزایش آن می شود.

۴. هم می تواند باعث کاهش و هم می تواند باعث افزایش آن می شود.

www.nashr-estekhdam.ir

۲۹- از نظر میزان انرژی خام، کدام گزینه صحیح است؟

۱. کربوهیدراتها < چربی ها

۳. اسیدهای چرب کوتاه زنجیر > اسیدهای چرب بلند زنجیر

۳۰- انرژی موجود در خوراکها برای طیور بر اساس کدام معیار ارزیابی می شود؟

۴. انرژی قابل متابولیسم

۳. انرژی خام

TDN ۲

۱. انرژی قابل هضم

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	د
2	ج
3	ج
4	ب
5	د
6	الف
7	ب
8	د
9	ج
10	الف
11	د
12	د
13	ز
14	ب
15	ز
16	ز
17	الف
18	ز
19	د
20	ب
21	ز
22	ب
23	د
24	ب
25	ز
26	ز
27	د
28	ب
29	ب
30	د

۱- کدام یک از ویتامین های زیر در روده کور سنتز یا تولید می شود؟

K_۴A .۴

B_۳K .۳

D_۲B .۲

D_۱E .۱

۲- بتاگلوكان در کدام یک از غلات زیر بیشتر یافت می شود؟

۴. جو و چاودار

۳. برنج و گندم

۲. گندم و سورگوم

۱. گندم و جو

۳- در واکنش مایلارد، طی فرآوری طبیعی سویا با حرارت، کدام اسید آمینه بیشتر آسیب می بیند؟

۴. لوسين

۳. لیزین

۲. آرژنین

۱. متیونین

۴- آغازگر تجزیه پروتئین در دستگاه گوارش طیور کدام آنزیم است؟

۴. پیپسین

۳. کیموترپسین

۲. الاستاز

۱. ترپسین

۵- کدام نوع ایزومرهای طبیعی اسید آمینه ای از بقیه سریع تر جذب می شوند؟

۴. D-لیزین

۳. D-آلانین

۲. L-لوسین

۱. L-لیزین

۶- ماده سمی موجود در پنبه دانه که می تواند بر قابلیت استفاده از پروتئین اثر منفی داشته باشد کدام است؟

۴. مواد گواترزا

۳. گوسیپیول

۲. تانن ها

۱. آنتی ترپسین ها

۷- هضم چربی ها در طیور زمانی به حد متعادل می رسد که چند درصد اسیدهای چرب جیره از نوع غیر اشباع باشد؟

۴. ۲۰ درصد

۳. ۳۰ درصد

۲. ۵۰ درصد

۱. ۸۰ درصد

۸- کدام عامل زیر هضم چربی ها را در طیور تحت تاثیر قرار نمی دهد؟

۲. تعداد باندهای مضاعف در اسید چرب

۱. طول زنجیره اسیدهای چرب

۴. جنس و نژاد جوجه ها

۳. نسبت اسد چرب اشباع به غیر اشباع

۹- کدام ویتامین در بافت پوششی روده کوچک از پیش ویتامین خود ساخته می شود؟

۴. ویتامین E

۳. ویتامین C

۲. ویتامین A

۱. ویتامین K

۱۰- کدام مورد انرژی حقيقی تصحیح شده بر اساس نیتروژن است؟

DCL .۴

TME .۳

AMEn .۲

ME .۱

۱۱- مهمترین عامل محیطی تاثیرگذار بر افزایش احتیاجات نگهداری حیوان کدام است؟

۲. تغییرات دمای هوا

۱. تغییرات رطوبت هوا

۴. تغییرات ارتفاع از سطح دریا

۳. تغییرات اکسیژن هوا

۱۲- کدام اسید چرب برای طیور ضروری محسوب می شود و باید از طریق خوراک تامین شود؟

۱. اوئیک ۲. پالمیتیک ۳. استئاریک ۴. لینوئیک

۱۳- اثر دینامیک خاص غذا (SDE) چیست؟

۱. مقداری انرژی که به صورت افت حرارتی پس از مصرف جیره ازدست می رود
۲. مقداری انرژی که به صورت افت حرارتی پس از مصرف جیره به دست می آید
۳. انرژی دفعی از طریق ادرار پس از مصرف جیره ازدست می رود
۴. انرژی متابولیسمی که برای هر کدام از بخش‌های خوراک به دست می آید

۱۴- NSP های موجود در دانه گندم و جو به ترتیب کدام اند؟

۱. رافینوز- بتاگلوكان ۲. استاکیوز- رافینوز ۳. آرابینوگزایلان ها- بتاگلوكان ۴. تان- بتاگلوكان

۱۵- اثرات شدید NSP ها با پرندگان و افزایش مدت انبارداری غلات می‌یابد؟

۱. افزایش - افزایش ۲. کاهش - کاهش ۳. کاهش - افزایش ۴. افزایش - کاهش

۱۶- در جیره های معمولی، کارایی تبدیل انرژی متابولیسمی (ME) به انرژی خالص (NE)، کدام است؟

۱. ۷۰ درصد ۲. ۸۲ درصد ۳. ۵۰ درصد ۴. ۶۰ درصد

۱۷- با افزایش سطح انرژی جیره، مقدار کلسیم و لیزین جیره به ترتیب چه تغییری می‌کند؟

۱. کاهش- کاهش ۲. کاهش- افزایش ۳. افزایش- کاهش ۴. افزایش- افزایش

۱۸- هنگام استرس حرارتی، مصرف غذاهای پر انرژی و مواد مغذای جیره باید به چه ترتیبی تغییر یابند؟

۱. افزایش- افزایش ۲. کاهش- کاهش ۳. کاهش- افزایش ۴. افزایش- کاهش

۱۹- کدام مورد جزء پروتئین های رشته ای نیست؟

۱. کلژن ۲. الاستین ۳. کراتین ۴. لیپوپروتئین

www.nashr-estekhdam.ir

۲۰- کدام اسید آمینه در طیور ضروری نیست؟

۱. لوسین ۲. والین ۳. تره اونین ۴. سرین

۲۱- کدام اسید آمینه به علت نقش آن در ساختن اسید اوریک در طیور غیرضروری اما مهم محسوب می شود؟

۱. گلیسین ۲. سرین ۳. متیونین ۴. آرژنین

۴۲- فقدان چرخه اوره در طیور، سبب ضروری شدن نیاز به کدام اسید آمینه در تغذیه طیور شده است؟

۱. آرژنین ۲. لیزین ۳. لوسين ۴. والین

۴۳- میزان احتیاجات طیور به اسید آمینه محدودگر، با افزایش پروتئین خام جیره چه تغییری پیدا می کند؟

۱. افزایش می یابد ۲. کاهش می یابد ۳. تعییری نمی کند ۴. بسته به گونه طیور می تواند کاهش یا افزایش یابد

۴۴- افزایش کدام اسید آمینه می تواند کارایی استفاده از اسید آمینه آرژنین را کاهش دهد؟

۱. لیزین ۲. متیونین ۳. ترئونین ۴. والین

۴۵- در معیار ارزش بیولوژیکی برای ارزیابی کیفیت پروتئین ها، کدام پروتئین به عنوان استاندارد با ارزش بیولوژیکی ۱۰۰ درصد در نظر گرفته می شود؟

۱. پروتئین سفیده تخم مرغ ۲. پروتئین گوشت مرغ ۳. پروتئین زرد تخم مرغ ۴. پروتئین کبد مرغ

۴۶- دقیق ترین شیوه بیان احتیاجات اسید آمینه در طیور کدام است؟

۱. میلی گرم به ازای هر پرنده در روز ۲. میلی گرم به ازای هر کیلوکالری انرژی قابل سوخت و ساز جیره ۳. بر حسب درصد جیره ۴. بر حسب درصد پروتئین

۴۷- در شرایط آب و هوای گرم، نسبت ME/P باید حدوداً چند درصد تغییر نماید؟

۱. ۱۰ درصد افزایش یابد ۲. ۲۰ درصد کاهش یابد ۳. ۲۰ درصد کاهش یابد ۴. ۲۰ درصد افزایش یابد

۴۸- افزایش کدام اسید آمینه در جیره می تواند سبب افزایش خطی اندازه تخم مرغ شود؟

۱. لیزین ۲. والین ۳. متیونین ۴. آرژنین

۴۹- در مدل پروتئین ایده آل، همه اسید آمینه ها نسبت به کدام اسید آمینه متوازن می شوند؟

۱. آسپارتیک اسید ۲. گلوتامیک اسید ۳. متیونین ۴. لیزین

۵۰- آنزیم آلفا آمیلاز توسط کدام اندام به دو دنوم ترشح می شود و در نهایت با هیدرولیز آن کدام ماده تولید می شود؟

۱. دودنوم-مالتوز ۲. لوزالمعده - مالتوز ۳. ژرژنوم-نشاسته ۴. لوزالمعده - نشاسته

شماره سؤال	پاسخ صحیح
1	ج
2	د
3	ج
4	د
5	الف
6	ج
7	الف
8	د
9	ب
10	ب
11	ب
12	د
13	الف
14	ج
15	د
16	الف
17	د
18	الف
19	د
20	د
21	الف
22	الف
23	الف
24	الف
25	الف
26	الف
27	ب
28	ج
29	د
30	ب

۱- بخش عمدۀ هضم کربوهیدرات‌ها در کجا اتفاق می‌افتد؟

- | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-------------|
| ۴. پیش معده | ۳. ژوژنوم | ۲. دودنوم | ۱. چینه دان |
|-------------|-----------|-----------|-------------|

۲- کدام ترکیب جزو الیگوساکاریدهای کنجاله سویا محسوب نمی‌شود؟

- | | | | |
|-----------|------------|-------------|------------------|
| ۴. سلپیوز | ۳. رافینوز | ۲. استاچیوز | ۱. آرابینوزایلان |
|-----------|------------|-------------|------------------|

۳- چه عاملی سبب ممانعت از هضم نشاسته سیب زمینی خام می‌شود؟

- | | | | |
|-------------------|---------------|-----------|----------|
| ۴. گروه‌های فسفات | ۳. بتا گلوکان | ۲. لیگنین | ۱. سلولز |
|-------------------|---------------|-----------|----------|

۴- اولین مکان تجزیه پروتئین در طیور کدام قسمت زیر می‌باشد؟

- | | | | |
|---------|---------------|-------------|---------|
| ۴. روده | ۳. معده حقيقی | ۲. چینه دان | ۱. دهان |
|---------|---------------|-------------|---------|

۵- ترشحات پیش معده شامل چه ترکیباتی است؟

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ۲. اسید هیدروکلریک و پپسینوژن | ۱. پپسینوژن و کیمو تریپسینوژن |
| ۴. تریپسینوژن و پپسینوژن | ۳. اسید کلریدریک و تریپسینوژن |

۶- وجود چه عاملی برای تبدیل شدن پپسینوژن به پپسین ضروری است؟

- | | | | |
|-------------------|------------|-----------|-------------------|
| ۴. اسیدهیدروکلریک | ۳. گاسترین | ۲. سکرتین | ۱. نمک‌های صفرابی |
|-------------------|------------|-----------|-------------------|

۷- پلی نوکلوتید از کدام قسمت ترشح می‌شود؟

- | | | | |
|--------|------------------|--------------|-------------|
| ۴. کبد | ۳. دیواره ژوژنوم | ۲. لوزالمعده | ۱. پیش معده |
|--------|------------------|--------------|-------------|

۸- با افزایش لیزین تزریقی یا خوراکی در طیور میزان کدام اسدآمینه در ادرار افزایش می‌یابد؟

- | | | | |
|-----------|-----------|------------|----------|
| ۴. آرژنین | ۳. پرولین | ۲. تیروزین | ۱. لیزین |
|-----------|-----------|------------|----------|

۹- برای درمان پارگی پوست در اثر مصرف هالوفوگینون کدام ویتلامین زیر تجویز می‌شود؟

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| K . ۴ | C . ۳ | D . ۲ | A . ۱ |
|-------|-------|-------|-------|

۱۰- اثر ماورای متابولیک چربی‌ها مربوط به کدام خصوصیت تغذیه‌ای چربی‌هاست؟

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| ۲. افزایش تولید آب متابولیک | ۱. کاهش حرارت تولیدی |
|-----------------------------|----------------------|

- | | |
|--|--|
| ۴. کاهش سرعت عبور مواد در دستگاه گوارش | ۳. افزایش سرعت عبور مواد در دستگاه گوارش |
|--|--|

۱۱- در بین املاح مختلف مواد معدنی کدام شکل بیشترین قابلیت هضم را دارد؟

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| ۴. کلراید | ۳. کربنات | ۲. سولفات | ۱. اکسید |
|-----------|-----------|-----------|----------|

۱۲- در کوتاه مدت کدام عامل تنظیم میزان مصرف خوراک را انجام می دهد؟

- ۲. سطح گلوکز خون
- ۴. اتساع دستگاه گوارش
- ۱. ترشح آنزیم های دستگاه گوارش
- ۳. سطح اسیدهای آمینه خون

۱۳- مازاد پروتئین در پرندگان به چه صورت دفع می گردد؟

- ۴. هیدروکسید سدیم
- ۳. آمونیاک
- ۲. اوره
- ۱. اسیداوریک

۱۴- مهمترین قند جهت تغذیه و سوخت ساز طیور کدام گزینه می باشد؟

- ۴. مانوز
- ۳. گالاكتوز
- ۲. فروکتوز
- ۱. گلوکز

۱۵- در مورد انواع مختلف انرژی کدام گزینه صحیح است؟

- ۲. میزان AME با کاهش خوراک افزایش می یابد
- ۴. در تعادل منفی ازت عدد AMEn کمتر از AME است
- ۱. TME تحت تاثیر مصرف خوراک قرار نمی گیرد
- ۳. در تعادل مثبت ازت عدد AMEn بیشتر از AME است

۱۶- در سیستم های NE (انرژی خالص) نقطه آغاز برآوردها کدام گزینه خواهد بود؟

- ۴. AMEn
- ۳. TMEn
- ۲. AME
- ۱. TME

۱۷- کارائی ذخیره پروتئین در بدن طیور به چه میزان می باشد؟

- ۴. ۲۸ درصد
- ۳. ۸۴ درصد
- ۲. ۴۸ درصد
- ۱. ۸۲ درصد

۱۸- بیشترین پروتئین موجود در پر کدام گزینه زیر می باشد؟

- ۴. کراتین
- ۳. آلبومین
- ۲. الاستین
- ۱. کلازن

۱۹- با هضم آمیلوپکتین اولین محصولی که در دستگاه گوارش ایجاد می شود چیست؟

- ۴. فروکتوز
- ۳. مالتوز
- ۲. نشاسته
- ۱. گلوگز

۲۰- کدام ترکیب زیر فسفولیپید نیست؟

- ۴. سفالین
- ۳. اتوکسی کوین
- ۲. اسفنگتومیلین
- ۱. لسیتین

۲۱- از کدام آنزیم زیر می توان برای هضم بهتر الیگوساکاریدهای سویا استفاده کرد؟

- ۴. الفا- گالاكتوزیداز
- ۳. بتا- گلوکوناز
- ۲. سلوبیاز
- ۱. الفا- آمیلاز

۴۲- با افزایش سن گله مادر احتیاجات انرژی علی رغم افت تخم مرغ:

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| ۱. کاهش می یابد | ۲. افزایش می یابد |
| ۳. تغییری نمی کند | ۴. ابتدا افزایش سپس کاهش می یابد |

۴۳- عامل اصلی بروز آب آوردگی شکم(آسیت) در جوجه های گوشتی چیست؟

- | | |
|------------------|--------------------|
| ۱. کمبود پروتئین | ۲. کمبود ویتامین A |
| ۳. کمبود اکسیژن | ۴. کمبود نمک |

۴۴- مصرف بیش از حد اسید بنزوئیک در شرایط تحقیقاتی منجر به کاهش کدام اسید آمینه در جیره می گردد؟

- | | |
|-------------|-------------|
| ۱. آرژنین | ۲. لوسین |
| ۳. هیستیدین | ۴. گلوتامین |

۴۵- دلیل لزوم افزودن اسید آمینه غیر ضروری گلیسین در جیره طیور چیست؟

- | | |
|---------------------|----------------------|
| ۱. تبدیل آن به سرین | ۲. تبدیل آن به کولین |
| ۳. جهت هضم لیپیدها | ۴. سمتیت |

۴۶- کدام اثر متقابل اسیدهای آمینه را نمی توان با افزودن سایر اسیدهای آمینه متعادل کرد؟

- | | |
|-------------|--------------|
| ۱. کمبود | ۲. عدم توازن |
| ۳. ناهمسازی | ۴. سمیت |

۴۷- از کدام ترکیب زیر می توان برای تعدیل جیره های با لیزین بسیار بالا استفاده کرد؟

- | | |
|-------------------|---------------|
| ۱. جوش شیرین | ۲. سولفات روی |
| ۳. کربنات پتابسیم | ۴. اسید روی |

۴۸- افزایش میزان لوسین جیره سبب افزایش نیاز کدام اسیدهای آمینه می گردد؟

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| ۱. لیزین و آرژنین | ۲. والین و سرین |
| ۳. ایزولوسین و گلیسین | ۴. والین و ایزولوسین |

۴۹- نسبت بین گرم افزایش وزن بدن به گرم پروتئین مصرفی بیانگر کدامیک از شاخص های ارزیابی پروتئین است؟

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| ۱. نسبت بازده پروتئین | ۲. ارزش بیولوژیک |
| ۳. بازده ابقای پروتئین | ۴. قابلیت استفاده پروتئین خالص |

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	ج
2	الف
3	د
4	ج
5	ب
6	د
7	ج
8	د
9	ج
10	د
11	ب
12	د
13	الف
14	الف
15	الف
16	د
17	ب
18	د
19	ج
20	ج
21	د
22	ب
23	ج
24	الف
25	ج
26	د
27	ب
28	د
29	الف
30	ب

۱- بیشتر مواد مغذی هضم شده در کدام قسمت دستگاه گوارش پرندگان جذب می شود؟

- | | | | |
|------------|-----------|----------|---------------|
| ۴. سکوم ها | ۳. ژوژنوم | ۲. دوازه | ۱. معده حقیقی |
|------------|-----------|----------|---------------|

۲- بخش عمدۀ کربوهیدرات موجود در غلات به چه صورتی دیده می شود؟

- | | | | |
|------------|------------|-----------|---------|
| ۴. پروتئین | ۳. ویتامین | ۲. نشاسته | ۱. چربی |
|------------|------------|-----------|---------|

۳- بتاگلوكان در کدام ماده غذائی زیر بیشتر یافت می شود؟

- | | | | |
|-------------|------------------|-----------|----------------|
| ۴. برنج وجو | ۳. گندم و چاودار | ۲. چاودار | ۱. جو و چاودار |
|-------------|------------------|-----------|----------------|

۴- با افزایش کدام ماده زیر در پرندگان میزان جذب اسیدپالمتیک افزایش می یابد؟

- | | | | |
|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| ۴. تری گلیسرید | ۳. اسیداستناریک | ۲. اسیدآرشیدونیک | ۱. اسید اولنیک |
|----------------|-----------------|------------------|----------------|

۵- درساختمان پر پرندگان کدام پروتئین دیده می شود؟

- | | | | |
|-----------|------------|------------|----------|
| ۴. کراتین | ۳. آلبومین | ۲. الاستین | ۱. کلازن |
|-----------|------------|------------|----------|

۶- گلوبولین اصلی سویا چه نام دارد؟

- | | | | |
|--------------|-----------|-------------|-------------|
| ۴. گلیگولپید | ۳. آرژنین | ۲. تیپتوفان | ۱. گلیسینین |
|--------------|-----------|-------------|-------------|

۷- اگر اسید اوریک موجود در مجاری ادراری پرندگان دفع نگردد کدام بیماری بروز می کند؟

- | | |
|--------------|----------------|
| ۲. پیلونفریت | ۱. نفروز کلیوی |
|--------------|----------------|

۸- اثرات متقابل اثرات متقابل صحیح در اسیدهای آمینه کدام است؟

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ۲. کمبود، عدم توازن، ناهمسازی، سمیت | ۱. کمبود، عدم توازن، همسازی، سمیت |
|-------------------------------------|-----------------------------------|

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| ۴. کمبود، توازن، همسازی، عدم سمیت | ۳. کمبود، توازن، همسازی، سمیت |
|-----------------------------------|-------------------------------|

۹- قابلیت استفاده از کدام اسیدآمینه با افزایش لیزین، به طور خطی کاهش می یابد؟

- | | | | |
|------------|----------|-----------|--------------|
| ۴. متیونین | ۳. والین | ۲. آرژنین | ۱. ایزولوسین |
|------------|----------|-----------|--------------|

۱۰- منابع گیاهی منابع گیاهی فاقد کدام ویتامین مورد نیاز در طیور می باشد؟

- | | | | |
|------|----|-------|---------|
| A. ۴ | B6 | ۳. ۲. | B12. ۱. |
|------|----|-------|---------|

۱۱- منظور از ارزش بیولوژیکی (BV) چیست؟

- | | |
|---|--|
| ۲. درصد پروتئین جذب و دفع شده می باشد. | ۱. درصد پروتئین هضم و دفع شده می باشد. |
| ۴. درصد پروتئین تولید شده در بدن می باشد. | ۳. درصد پروتئین هضم و جذب شده می باشد |

۱۲- به کمک نحوه رشد کدام باکتری می توان کیفیت پروتئین و قابلیت دستررسی اسیدآمینه را تعیین نمود؟

- ۱. کلستریدیومها
- ۲. استرپتوکوکوس آگالاكتیه
- ۳. استرپتوکوکوس زیموژنر
- ۴. ایکولای

۱۳- دقیق ترین روش برآورد احتیاجات پرندگان به اسیدآمینه ها کدام گزینه زیر می باشد؟

- ۱. میلی گرم از هر اسیدآمینه به ازای هر پرنده در روز
- ۲. میلی گرم از هر اسیدآمینه به ازای هر پرنده در ماه
- ۳. میلی گرم از هر اسیدآمینه به ازای هر پرنده در سال
- ۴. بر حسب درصد جیره برای هر پرنده در روز

۱۴- تولید تخم مرغ در چند هفتگی به اوج یا پیک می رسد؟

- ۱. ۱۸ هفتگی
- ۲. ۲۵ هفتگی
- ۳. ۷۸ هفتگی
- ۴. ۶۰ هفتگی

۱۵- کدام اسیدآمینه زیر بر اندازه تخم مرغ تاثیر زیادی دارد؟

- ۱. لیزین
- ۲. تریپتوفان
- ۳. گلایسین
- ۴. متیونین

۱۶- برای افزایش برای تولیدگوشت سینه وجود کدام اسیدآمینه در جیره طیور گوشتی ضروری می باشد؟

- ۱. لیزین
- ۲. متیونین
- ۳. والین
- ۴. ایزولوسین

۱۷- در پرندگان منطقه آسایش با تغییرات کدام مورد تغییر می کند؟

- ۱. وزن
- ۲. قد
- ۳. چربی
- ۴. سن

۱۸- مهمترین منوساکارید جهت تغذیه و سوخت ساز بدن طیور چیست؟

- ۱. مانوز
- ۲. فروکتوز
- ۳. گالاكتوز
- ۴. گلوکز

۱۹- کدام لیپید در تغذیه طیور ضروری است؟

- ۱. اسیدپالمتیک
- ۲. اسیدلیپولئیک
- ۳. اسیدمیریستیک
- ۴. اسیدلوریک

۲۰- مهمترین جزء جیره پرندگان که در زرد شدن پوست و زرد تخم مرغ نقش بالائی دارد، چیست؟

- ۱. سویا
- ۲. جو
- ۳. پودر ماهی
- ۴. ذرت

۲۱- در شرایط استرس حرارتی در طیور، از چه منبع غذائی بیشتر استفاده می شود؟

- ۱. منابع غذائی کم انرژی
- ۲. منابع غذائی پرانرژی
- ۳. منابع غذائی پروتئین دار
- ۴. منابع غذائی با فیبر بالا

۴۲- آب آورده‌گی شکم (آسیت) در طیور به چه علت بروز می‌کند؟

- ۱. نقص در سوخت و ساز چربی‌ها
- ۲. نقص در سوخت و ساز پروتئین‌ها
- ۳. نقص در سوخت و ساز اکسیژن
- ۴. نقص در نقل و انتقال آب در بدن

۴۳- برای جذب و برای قابلیت دسترسی به کدام عنصر، وجود اسید فیتیک در جیره ضروری می‌باشد؟

- ۱. آهن
- ۲. فسفر
- ۳. کلسیم
- ۴. مس

۴۴- در کدام دسته از مرغها مقدار «کل پروتئین جیره» بر اشتهای پرنده بی‌اثر است؟

- ۱. مرغهای تخم‌گذار
- ۲. مرغهای گوشتی
- ۳. مرغهای مادرگوشتی
- ۴. مرغهای اجداد

۴۵- با افزایش انرژی، میزان ابقاء نسبی انرژی در بدن، به چه شکل افزایش می‌یابد؟

- ۱. چربی و پروتئین
- ۲. چربی و ویتامین
- ۳. پروتئین و ویتامین
- ۴. کربوهیدرات و مواد معدنی

۴۶- حجم عمدۀ چربی در بدن طیور به چه صورت ذخیره می‌شود؟

- ۱. چربی اشباع
- ۲. چربی غیراشباع
- ۳. گلیکوزن
- ۴. چربی خنثی

۴۷- در چه شرایطی پرنده برای تأمین انرژی مورد نیاز خود، کاهش وزن پیدا می‌کند؟

- ۱. در سرمای زیاد
- ۲. در حالت کمبود پروتئین
- ۳. در گرمای زیاد
- ۴. افزایش احتیاجات نگهداری به هر دليل

www.nashr-estekhdam.ir

۴۸- در کدام گروه از پرنده‌گان، مقدار رشد، رشد پر و اسکلت بدن از مهمترین معیارهایست؟

- ۱. پرنده‌گان بالغ
- ۲. پرنده‌گان نابالغ
- ۳. جوجه‌های یکروزه
- ۴. مرغهای تخم‌گذار

۴۹- کدام یک از اجزاء جیره طیور تنها وظیفه حجم دهنده را بر عهده دارد؟

- ۱. سلولز
- ۲. کربوهیدراتها
- ۳. چربیها
- ۴. ویتامینها

۵۰- آنزیمهای تجزیه کننده پروتئین، از کدام قسمت دستگاه گوارش پرنده‌گان آزاد می‌شود؟

- ۱. چینه دان
- ۲. روزنوم
- ۳. دودنوم
- ۴. ایلئوم

سؤال	جواب
26	د
27	ج
28	ب
29	الف
30	ب

سؤال	جواب
1	ج
2	ب
3	الف
4	الف
5	د
6	الف
7	ج
8	ب
9	ب
10	ب
11	ج
12	ج
13	الف
14	ب
15	د
16	الف
17	د
18	د
19	ب
20	د
21	ب
22	ج
23	ب
24	الف
25	الف

۱- حیوانات آب مورد نیاز خود را از چه منابعی تامین می کنند؟

- ۲. آب آشامیدنی-آب متابولیکی
- ۴. آب آشامیدنی-آب موجود در غذا-آب متابولیکی
- ۱. آب آشامیدنی-آب موجود در غذا
- ۳. آب موجود در غذا-آب متابولیکی

۲- ADF و NDF حاصل از هضم نمونه غذایی به ترتیب معرف چه قسمتهایی از گیاه می باشند؟

- ۲. سلولز ، همی سلولز-لیگنین، سلولز
- ۴. لیگنین، سلولز - لیگنین، سلولز ، همی سلولز
- ۱. لیگنین، سلولز ، همی سلولز- لیگنین، سلولز
- ۳. لیگنین، سلولز ، همی سلولز- سلولز ، همی سلولز

۳- کدام یک جزء قندهای مونوساکاریدی می باشد؟

- ۴. گلیکوژن
- ۳. نشاسته
- ۲. فروکتوز
- ۱. سلولز

۴- کدام یک از گیاهان زیر برای تغذیه حیوانات خطرناک می باشند؟

- ۴. غلات
- ۳. چغندر علوفه ای
- ۲. لوبیای جاوه ای
- ۱. گندمیان

۵- کدم کربوهیدرات نقش اساسی در متابولیسم انرژی دارد؟

- ۴. فروکتوز
- ۳. سلولز
- ۲. گلیکوژن
- ۱. آمیلوز

۶- کدامیک از اسیدهای چرب زیر در شیر نشخوارکنندگان در مقادیر قابل ملاحظه ای یافت می شود؟

- ۴. اسید آرشیدونیک
- ۳. اسید اولئیک
- ۲. اسید استیک
- ۱. اسید بوتیریک

۷- مهمترین آنتی اکسیدان طبیعی کدام است؟

- ۴. هیدروکسی کوئینون
- ۳. ویتامین E
- ۲. کاروتون
- ۱. ویتامین C

۸- کدام یک از اسیدهای چرب زیر در شیر نشخوارکنندگان وجود دارد؟

- ۲. لوریک - مریستیک
- ۴. آرشیدونیک - لینولئیک
- ۱. بوتیریک - کاپروئیک
- ۳. پالمتیک - استئاریک

www.nashr-estekhdam.ir

۹- محصول نهایی و اصلی متابولیسم ازت در پستانداران چیست؟

- ۴. اسید استیک
- ۳. آلانتیون
- ۲. اوره
- ۱. اسید اوریک

۱۰- از هیدرولیز پروتئینها چه ترکیباتی تولید می شود؟

- ۴. مونوساکاریدها
- ۳. اسیدهای نوکلئیک
- ۲. اسیدهای آمینه
- ۱. اسیدهای چرب

- ۱۱- پس از حذف گروه کربوکسیل از اسید آمینه کدام ترکیب تولید می شود؟
۱. آکالوئید ۲. نیتریت ۳. پرولین ۴. آمین
- ۱۲- کدام دسته از ویتامین های زیر محلول در چربی می باشند؟
۱. ویتامین A- ویتامین C ۲. ویتامین B۱۲- ویتامین B ۳. ویتامین های گروه B ۴. ویتامین A- ویتامین B۶
- ۱۳- بیماری اسکوروی در اثر کمبود کدام ویتامین در بدن ایجاد می شود؟
۱. ویتامین D ۲. ویتامین C ۳. ویتامین A ۴. ویتامین E
- ۱۴- کدام ویتامین در نشخوارکنندگان به وسیله میکرووارگانیسمهای شکمبه ساخته می شود؟
۱. ویتامین A ۲. ویتامین B۱۲ ۳. ویتامین C ۴. ویتامین E
- ۱۵- در تغذیه نشخوارکنندگان جهت ارزیابی وضعیت الکتروولیتی جیره های غذایی از چه تعادلی استفاده می شود؟
۱. تعادل کاتیون- کاتیون ۲. تعادل آنیون- آنیون ۳. تعادل کاتیون- آنیون ۴. تعادل کاتیون- آنیون
- ۱۶- کدام یک از عناصر زیر نقش مهمی در ایجاد پیچش در پشم ایفا می کند؟
۱. آهن ۲. کلسیم ۳. مولیبدن ۴. مس
- ۱۷- اگر در جیره غذایی حیوانات جوان و در حال رشد کلسیم به مقدار کافی موجود نباشد چه بیماری رخ می دهد؟
۱. اسکوروی ۲. اسیدوز ۳. ریکتوز ۴. کانی بالیسم
- ۱۸- در نامگذاری سیستماتیک آنزیم ها قسمت اول نامگذاری نشان دهنده چیست؟
۱. سوبیسترا ۲. نوع واکنش ۳. نوع کاتالیزور ۴. نوع آنزیم
- ۱۹- چه تغییری در رشد میکروارگانیسم های شکمبه در جیره های غذایی بالاتر از ده درصد چربی اتفاق می افتد؟
۱. افزایش می یابد ۲. کاهش می یابد ۳. تغییری نمی کند ۴. ابتدا افزایش سپس کاهش می یابد
- www.nashr-estekhdam.ir
- ۲۰- در صورتیکه جیره نشخوارکنندگان حاوی نسبت بالایی از مواد متراکم از جمله کنسانتره باشد، تجمع کدام یک از ترکیبات زیر باعث اسیدوز می شود؟
۱. پپروویت ۲. سوکسینیت ۳. لاکتیت ۴. آکریلیت

-۲۱- بیشترین نرخ تولید گاز در شکمبه گاو مربوط به کدام یک از ترکیب گازهای زیر است؟

۱. گاز کربنیک - ازت ۲. متان - هیدروژن- اکسیژن ۳. هیدروژن- اکسیژن ۴. گاز کربنیک - متان

-۲۲- اصلی ترین منبع تولید گلوکز در نشخوارکنندگان کدام ترکیب است؟

۱. گلیکوژن ۲. لاکتیت ۳. گلیسرول ۴. پروپیونیت

-۲۳- در صورتیکه اسید پروپیونیک وارد سیکل اسید تری کربوکسیلیک شود چند مول ATP تولید می شود؟

۱. ۱۷ مول ۲. ۱۸ مول ۳. ۳۶ مول ۴. ۳۸ مول

-۲۴- چه ترکیباتی از متابولیسم تری گلیسرید تولید می شود؟

۱. اسیدهای آمینه - گلیسرول ۲. اسیدهای چرب- گلیسرول ۳. اسید های چرب ۴. اسید تری کربوکسیلیک

-۲۵- دقیق ترین تعریف برای قابلیت هضم غذا کدام است؟

۱. نسبتی از غذا که دفع نشده و توسط حیوان خورده شده است ۲. نسبتی از غذا که توسط حیوان خورده شده است ۳. تمام غذایی که در اختیار حیوان قرار گرفته است

-۲۶- مقادیر سیلیس و تانن در برخی از مواد غذایی چه تاثیری بر قابلیت هضم آنها دارند؟

۱. قابلیت هضم را افزایش می دهد ۲. قابلیت هضم را کاهش می دهد ۳. تاثیری بر قابلیت هضم ندارند ۴. قابلیت هضم را ابتدا کاهش سپس افزایش می دهد

-۲۷- انرژی قابل متابولیسم ترکیبات غذایی چگونه محاسبه می شود؟

۱. مجموع انرژی ادرار و گاز منهای انرژی خام ۲. انرژی ادرار منهای انرژی قابل هضم ۳. انرژی گاز منهای انرژی قابل هضم ۴. مجموع انرژی ادرار و گاز منهای انرژی قابل هضم

www.nashr-estekhdam.ir

-۲۸- منظور از کسر تنفسی چیست؟

۱. نسبت بین حجم گاز متan تولید شده به حجم اکسیژن مصرف شده ۲. نسبت بین حجم گاز کربنیک تولید شده به حجم هیدروژن مصرف شده ۳. نسبت بین حجم هیدروژن تولید شده به حجم اکسیژن مصرف شده ۴. نسبت بین حجم گاز کربنیک تولید شده به حجم اکسیژن مصرف شده

-۲۹- عمدۀ ترین تفاوت سیستم‌های انرژی برای نشخوارکنندگان در چیست؟

- ۱. واحدهای مورد استفاده
- ۲. جیره های مورد استفاده
- ۳. مورد استفاده TDN
- ۴. تفاوتی با یکدیگر ندارند.

-۳۰- در سیستم ARC سال ۱۹۸۰ ارزش غذاها چگونه بیان می شود؟

- ۱. بر حسب انرژی قابل هضم جیره غذایی
- ۲. بر حسب انرژی قابل متابولیسم جیره غذایی
- ۳. بر حسب انرژی خام جیره غذایی
- ۴. بر حسب ترکیبات جیره غذایی

شمارد سؤال	باسخ صحيح
1	د
2	الف
3	ب
4	ب
5	ب
6	الف
7	ج
8	الف
9	ب
10	ب
11	د
12	الف
13	ب
14	ب
15	ج
16	د
17	ج
18	الف
19	ب
20	ج
21	د
22	د
23	الف
24	ب
25	الف
26	ب
27	د
28	د
29	الف
30	ب