

-۱- متغیری که از نظر تئوری فرض شود هر مقداری بین مقادیر مفروض را اختیار کند، چه نامیده می شود؟

۲. پیوسته

۱. گسسته

۴. بسته به دقت اندازه گیری دارد

۳. کیفی

-۲- نمودار خطی که در آن فراوانی دسته نسبت به متوسط دسته رسم می گردد، چه می گویند؟

۴. هیستوگرام

۳. پایی گن

۲. میله ای

۱. ستونی

-۳- میانگینی که غالباً کاربردهای فیزیکی دارد، چه نامیده می شود؟

۲. ریشه میانگین مربعات

۱. حسابی

۴. هارمونیک

۳. هندسی

-۴- عدد $10 - 3 = 1/600 \times 1001600$ چند رقم مهم دارد؟

۴. پنج رقم

۳. چهار رقم

۲. سه رقم

۱. دو رقم

-۵- کدامیک از عبارات زیر معرف داده های پیوسته می باشد؟

www.nashr-estekhdam.ir

۱. سرعت یک اتومبیل به کیلومتر در ساعت

۲. تعداد صورتحساب های ۴۰ دلاری که در هر زمان در آمریکا منشر می گردد

۳. مقدار کل سهام به فروش رفته در روز در بازار بورس

۴. تعداد دانشجویان ورودی یک دانشگاه طی چندین سال

-۶- از حاصل جمع حد بالای یک دسته با حد پایین دسته بعدی تقسیم بر ۲ ، کدام مورد حاصل می گردد؟

۴. حدود دسته

۳. اندازه فاصله دسته

۲. متوسط دسته

۱. فاصله دسته

-۷- در یک مجموعه، داده حداقل و حداکثر به ترتیب ۳۲۱ و ۵۲۰ می باشد، چنانچه ۱۰ طبقه انتخاب شده باشد، فاصله طبقات کدام مقدار است؟

۴. ۳۵

۳. ۳۴

۲. ۲۰

۱. ۱۸

-۸ در جدول زیر، درصد فراوانی تجمعی طبقه سوم کدام است؟ (F_i : فراوانی مطلق می باشد)

۱۲	۹	۷	۵	۲	X _i
۱۴	۲۰	۵	۴	۷	F _i

۴. ۴۵ درصد

۳. ۴۲ درصد

۲. ۳۵ درصد

۱. ۳۲ درصد

-۹ در یک جدول توزیع فراوانی حجم نمونه برابر ۴۰ و فراوانی مطلق طبقه سوم آن برابر ۵ است، درصد فراوانی نسبی آن کدام است؟

۴. ۱۳/۵ درصد

۳. ۱۲/۵ درصد

۲. ۱۱/۵ درصد

۱. ۱۰/۵ درصد

-۱۰ میانگین هندسی اعداد ۸، ۴، ۱، ۵/۰ برابر کدام مقدار است؟

۴. ۴

۳. ۳

۲. ۲

۱. ۱

-۱۱ با توجه به جدول توزیع فراوانی زیر، مُد (نما) برابر کدام مقدار است؟

۶	۳	۵	۴	۲	X _i
۲۵	۱۵	۳۰	۱۰	۲۰	فراوانی نسبی درصد

۵. ۴

۶. ۳

۷. ۲

۸. ۱

www.nashr-estekhdam.ir

-۱۲ با توجه به جدول زیر، میانگین حسابی برابر کدام مقدار است؟

۶	۳	۵	۴	۲	X _i
۲۵	۱۵	۳۰	۱۰	۲۰	فراوانی نسبی درصد

۱۰/۳۵ . ۴

۷/۳۵ . ۳

۵/۲۵ . ۲

۴/۲۵ . ۱

-۱۳ با توجه به جدول زیر، انحراف معیار برابر کدام مقدار است؟

۶	۳	۵	۴	۲	X _i
۲۵	۱۵	۳۰	۱۰	۲۰	فراوانی نسبی درصد

۱/۶۷ . ۴

۲/۶۷ . ۳

۱/۴۸ . ۲

۲/۴۸ . ۱

-۱۴ نمرات نهایی یک دانشجو در ریاضیات، فیزیک و انگلیسی به ترتیب ۸۲، ۸۶ و ۹۰ می باشد. اگر واحدهای درسی مذکور به ترتیب ۳، ۵ و ۳ باشد، متوسط مناسب نمرات مذکور چقدر است؟

۵۸ . ۴

۸۶ . ۳

۷۹ . ۲

۷۳ . ۱

-۱۵ چارک دوم (Q_2) برابر کدامیک از اندازه های تمایل به مرکز است؟

۴. میانگین درجه دوم

۳. میانگین حسابی

۲. مُد

۱. میانه

-۱۶ دامنه چارک داخلی با کدام رابطه نشان داده می شود؟

$Q_3 - Q_1$. ۴

$Q_3 + Q_1$. ۳

$2Q_3 + 2Q_1$. ۲

$2Q_3 - 2Q_1$. ۱

-۱۷ واریانس دسته اعداد ۱۲، ۱۲، ۶، ۷، ۳، ۱۵، ۱۰، ۱۰، ۱۸ و ۵ چقدر است؟

۱۲/۰۵ . ۴

۴۵/۳۲ . ۳

۲۳/۷۵ . ۲

۲۵/۳۴ . ۱

-۱۸ میانگین انحرافات دسته اعداد ۳، ۲، ۶، ۳، ۲، ۸ و ۱۱ کدام است؟

۳/۹ . ۴

۲/۸ . ۳

۱۰/۷ . ۲

۶/۵ . ۱

www.nashr-estekhdam.ir

-۱۹ کدام رابطه ضریب اول چولگی پیرسون را نشان می دهد؟

$$\frac{\bar{X} - MO}{S} \text{ چولگی } . ۲$$

$$\frac{\bar{X} + MO}{S} \text{ چولگی } . ۱$$

$$\frac{3(X - MO)}{S} \text{ چولگی } . ۴$$

$$\frac{3(X + MO)}{S} \text{ چولگی } . ۳$$

-۲۰ گشتاورهای اول و دوم داده های ۲، ۳، ۵، ۷، ۸، ۱۱ به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

۲۹/۳۳ و ۸ . ۴

۵۳/۳۳ و ۶ . ۳

۳۵/۳۳ و ۸ . ۲

۴۵/۳۳ و ۶ . ۱

-۲۱ ضریب گشتاوری کشیدگی با کدام حالت نشان داده می شود؟

$$\frac{m_4}{S^4} . ۴$$

$$\frac{m_4}{S^4} - 3 . ۳$$

$$\frac{m_2}{S^2} - 3 . ۲$$

$$\frac{m_2}{S^2} . ۱$$

-۲۲- چنانچه جعبه‌ای شامل ۳ توپ سفید و ۲ توپ سیاه باشد، احتمال اینکه اولین توپ انتخاب شده از جعبه سیاه باشد، چقدر است؟

$$\frac{3}{5} \cdot 4$$

$$\frac{1}{10} \cdot 3$$

$$\frac{2}{5} \cdot 2$$

$$\frac{1}{5} \cdot 1$$

-۲۳- به چند طریق ۱۰ شیء می‌تواند به ترتیب در دو گروه ۴ و ۶ تایی قرار گیرد؟

$$230 \cdot 4$$

$$210 \cdot 3$$

$$170 \cdot 2$$

$$150 \cdot 1$$

-۲۴- به چند طریق ۵ فرد می‌توانند بر روی یک نیمکت که جای ۳ نفر دارد، بنشینند؟

$$45 \cdot 4$$

$$55 \cdot 3$$

$$50 \cdot 2$$

$$60 \cdot 1$$

-۲۵- احتمال به دست آوردن حداقل ۴ شیر در ۶ پرتاب یک سکه متعادل کدام است؟

$$\frac{11}{32} \cdot 4$$

$$\frac{25}{37} \cdot 3$$

$$\frac{15}{45} \cdot 2$$

$$\frac{15}{35} \cdot 1$$

-۲۶- ضریب گشتاور چولگی در توزیع نرمال برابر کدام است؟

$$3 \cdot 4$$

$$2 \cdot 3$$

$$2 \cdot \text{صفر}$$

$$1 \cdot 1$$

-۲۷- کدام آزمون فقط وقتی کاربرد دارد که دو نمونه مستقل نباشد و مشاهدات به صورت جفتی انتخاب شده باشد؟

۲. آزمون غیر تصادفی

www.nashr-estekhdam.ir

۱. آزمون تصادفی

۴. آزمون t برای داده‌های جفتی

۳. آزمون t – استیوئنست

-۲۸- برای آزمون میانگین طول عمر افراد آزمون فرض $H_0: \mu = 50$ در مقابل $H_1: \mu \neq 50$ مورد نظر است. اگر

و تعداد نمونه $N = 9$ باشد، مقدار آماره آزمون کدام است؟

$$\frac{3}{8} \cdot 4$$

$$\frac{8}{3} \cdot 3$$

$$\frac{-5}{3} \cdot 2$$

$$-\frac{3}{5} \cdot 1$$

۴۹- اعتبار یک آزمون کدامیک از موارد زیر است؟

۱. احتمال قبول شدن فرض صفر وقتی که فرض صفر عملاً درست است.
۲. احتمال رد شدن فرض صفر وقتی که فرض صفر عملاً درست است.
۳. احتمال رد شدن فرض صفر وقتی که فرض صفر عملاً نادرست است.
۴. احتمال قبول شدن فرض صفر وقتی که فرض صفر عملاً نادرست است.

۴۰- کدام مورد درباره توزیع کی دو χ^2 با ۷ درجه آزادی صحیح نمی باشد؟

۱. حدود تغییرات آن از صفر تا بی نهایت است.
۲. متقارن است.

www.nashr-estekhdam.ir

۳. امید ریاضی آن برابر ۷ است.

۴. مقادیر کی دو χ^2 برای درجه آزادی یک برابر با مقادیر Z می باشد.

1	ج.
2	ج
3	ج.
4	ج
5	الف
6	د
7	ب.
8	الف
9	ج
10	ب.
11	د
12	الف
13	ب.
14	ج
15	الف
16	د
17	ب.
18	ج
19	ب.
20	الف
21	ج
22	ب.
23	ج
24	الف
25	د
26	ب.
27	د
28	الف
29	ج
30	ب.

- مساحت قاره آفریقا $\frac{3}{3}$ میلیون کیلو متر مربع از کل $133 \frac{1}{3}$ میلیون کیلو متر مربع مساحت کل قاره ها است. زاویه قطاع مربوط به قاره آفریقا در نمودار دایره ای چقدر است؟

۳۰/۳ . ۴

۳۶۰ . ۳

۲۷۸ . ۲

۸۲ . ۱

- در یک جدول فراوانی حدود دو دسته متواالی ۶۳-۶۵ و ۶۰-۶۲ است. طول دسته چقدر است؟

۳ . ۴

۵ . ۳

۱ . ۲

۲ . ۱

- فراوانی نسبی دسته ای $\frac{3}{5}$ و تعداد کل فراوانی ۱۰۰ می باشد، فراوانی دسته چقدر است؟

۰/۶۵ . ۴

۶۵ . ۳

۱۰۰ . ۲

۳۵ . ۱

- دامنه داده های $124, 123/5, 141, 145/6, 128$ چقدر است؟

۱۱/۰۵ . ۴

۴ . ۳

۲۲/۱ . ۲

۲۱/۶ . ۱

- میانگین حسابی و واریانس داده های $25, 24, 18, 15, 13$ کدام است؟

$$\bar{x} = 95, S^2 = 22/8 \quad .2$$

$$\bar{x} = 19, S^2 = 28/5 \quad .1$$

$$\bar{x} = 19, S^2 = 22/8 \quad .4$$

www.nashr-estekhdam.ir

$$\bar{x} = 95, S^2 = 28/5 \quad .3$$

- در جدول فراوانی زیر میانه و مد به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

دسته	۰-۴	۵-۹	۱۰-۱۴	۱۵-۱۹	۲۰-۲۴
فراوانی	۳	۵	۱۰	۵	۳

۱۰, ۱۲ . ۴

۱۲, ۱۰ . ۳

۱۲, ۱۲ . ۲

۱۰, ۱۰ . ۱

- میانگین هندسی داده های $8, 4, 2$ کدام است؟

۳ . ۴

۴ . ۳

۱/۱۴ . ۲

۵/۳۳ . ۱

- در جدول فراوانی زیر انحراف معیار چقدر است؟

متوسط دسته	۶۱	۶۴	۶۷	۷۰	۷۳
فراوانی	۵	۱۸	۴۲	۲۷	۸

۸/۲ . ۴

۶۷/۴۵ . ۳

۸/۵۳ . ۲

۲/۹۲ . ۱

-۹ اگر $\bar{x} = ۹/۵, S^2 = ۲۳/۷۵$ ضریب تغییرات چقدر است؟

۰/۵۱ . ۴

۰/۴ . ۳

۱/۹۵ . ۲

۲/۵ . ۱

-۱۰ فرض کنید $Q_1 = ۶۵/۶۴, Q_۳ = ۶۹/۶۱, P_{۱۰} = ۶۳/۳۳, P_{۹۰} = ۷۱/۲۷$ ، دامنه انحرافات چارکی چقدر است؟

۷/۹۴ . ۴

۳/۹۷ . ۳

۱/۹۸ . ۲

۶۷/۶۳ . ۱

-۱۱ اگر $S^2 = ۸/۵ ۳, m_p = ۱۹۹/۳۸$ آنگاه ضریب گشتاوری کشیدگی چقدر است؟

۰/۳۶ . ۴

۲/۷۴ . ۳

۲۳/۳۷ . ۲

۲/۹۷ . ۱

-۱۲ فرض کنید $۲۷۹/۰۶ = \text{میانه}$ و $۲۷۷/۵ = \text{مد}$ و $۲۷۹/۷۷ = \bar{x}$ ، آنگاه ضریب اول چولگی پیرسون چقدر است؟

www.nashr-estekhdam.ir

۰/۷ . ۴

۰/۸۵ . ۳

۰/۱۳ . ۲

۰/۱۴ . ۱

-۱۳ احتمال اینکه فرد اول تا ۲۰ سال دیگر زنده باشد ۷/۰ و احتمال اینکه فرد دوم تا ۲۰ سال دیگر زنده باشد ۵/۰ است. احتمال اینکه آنها در ۲۰ سال دیگر زنده باشند چقدر است؟

۰/۲۸ . ۴

۰/۸۵ . ۳

۰/۲ . ۲

۰/۳۵ . ۱

-۱۴ فرض کنید جعبه‌ای شامل ۳ توپ سفید و ۲ توپ سیاه است. دو توپ به تصادف و بدون جایگذاری انتخاب می‌شود، احتمال اینکه هر دو سفید باشند چقدر است؟

$\frac{۳}{۱۰} . ۴$

$\frac{۳}{۵} . ۳$

$\frac{۱}{۲} . ۲$

$\frac{۹}{۲۵} . ۱$

۱۵- به چند طریق می توان ۱۰ شی را در دو گروه ۴ تایی و ۶ تایی قرار داد؟

۱۰! . ۴

۵۰۴ . ۳

۲۴ . ۲

۲۱۰ . ۱

۱۶- فرض کنید $p(A \cap B) = 0/3$, $p(B) = 0/4$, $p(A \cup B) = 0/6$ چقدر است؟

۱ . ۴

۰/۱ . ۳

۰/۵ . ۲

۰/۷ . ۱

۱۷- امید ریاضی X در جدول توزیع احتمال زیر چقدر است؟

x	۸	۱۲	۱۶	۲۰	۲۴
$p(x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{6}$	a	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$

۱۶ . ۴

۱ . ۳

$\frac{۳}{8}$. ۲

$10+16a$. ۱

۱۸- احتمال به دست آوردن دقیقا ۲ شیر در ۶ پرتاب یک سکه متعادل چقدر است؟

$\frac{۲}{64} . ۴$

$\frac{۳}{64} . ۳$

$\frac{۱}{64} . ۲$

$\frac{۱۵}{64} . ۱$

www.nashr-estekhdam.ir

۱۹- در توزیع دوجمله‌ای کدام گزینه درست است؟

$\mu = npq$. ۴

$\mu = np$. ۳

$\sigma^2 = \sqrt{npq}$. ۲

$\sigma = npq$. ۱

۲۰- در توزیع دوجمله‌ای چه موقع از تقریب نرمال استفاده می شود؟

۱. N بزرگ و P یا q کوچک باشند.

۲. N بزرگ و P یا q به صفر خیلی نزدیک نباشند.

۳. N بزرگ و P و q کوچک باشند.

۲۱- در یک امتحان با میانگین ۷۲ و انحراف معیار ۱۵ نمره استاندارد دانشجویی که نمره ۹۳ گرفته، چقدر است؟

-۰/۸ . ۴

۰/۸ . ۳

-۱/۴ . ۲

۱/۴ . ۱

-۲۲- متوسط زمانی که ۵۰۰ دانشجو صرف حل یک تمرین می کنند ۱۵۱ ثانیه با انحراف معیار ۱۵ ثانیه است. با فرض اینکه توزیع زمان نرمال باشد، چند دانشجو بیش از ۱۸۵ ثانیه صرف می کنند؟

۲۴۴ . ۴

۶ . ۳

۱۰ . ۲

۲/۲۷ . ۱

-۲۳- در صورتی که احتمال رنج بردن یک فرد از عکس العمل بد در مقابل تزریق سرم معینی ۱/۰۰۱ باشد، احتمال اینکه از ۲۰۰۰ فرد دقیقاً ۳ نفر از این عکس العمل بد رنج ببرند چقدر است؟

$$1 - e^{-\frac{3}{2}} = 1 - \frac{e^{-\frac{3}{2}}}{75}$$

$$e^{-\frac{3}{2}} = \frac{1}{75} = 0.0133$$

$$e^{-\frac{3}{2}} = 0.0133$$

$$\left(\frac{4000}{3} \right) \left(\frac{1}{0.01} \right)^3 \left(\frac{1}{999} \right)^{1997}$$

-۲۴- کدام گزینه درست است؟

۱. اشتباه نوع اول عبارتست از رد فرض صفر وقتی که غلط است.

۲. اشتباه نوع اول عبارتست از پذیرش فرض صفر وقتی که غلط است.

۳. اشتباه نوع اول عبارتست از رد فرض صفر وقتی که صحیح است.

۴. اشتباه نوع اول عبارتست از پذیرش فرض صفر وقتی که صحیح است.

www.nashr-estekhdam.ir

-۲۵- نژادگری ادعا کرده است که واریته پنبه او حداقل ۴۰ درصد الیاف در تخم پنبه می باشد. او ۱۸ نمونه ۱۰۰ گرمی انتخاب و درصد الیاف هر نمونه را تعیین و اطلاعات زیر را به دست آورد:

$$\bar{x} = 37 / 21, S^2 = 0.63$$

مقدار آماره آزمون برای آزمون $H_0: \mu = 40$ در مقابل $H_1: \mu \neq 40$ کدام است؟

۱۸/۲۶ . ۴

-۱۸/۲۶ . ۳

۱۴/۸۹ . ۲

-۱۴/۸۹ . ۱

-۲۶- فرض کنید $\mu = 22$ است، مقدار $n_1 = 7, n_2 = 6, S_1^2 = 351 / 6, S_2^2 = 250 / 24$ چقدر است؟

۱۷/۳۵ . ۴

۱۷/۴۸ . ۳

۳۰.۵/۵۴ . ۲

۹/۵۹ . ۱

-۴۷ برای آزمون تخمین مدیر که ۶۰ درصد از کارکنان از طرح اعانه مدیر حمایت می‌کنند، یک نمونه ۱۵۰ نفری از کارکنان انتخاب شده و نظر آنها در مورد حمایت یا عدم حمایت پرسیده شد. از ۱۵۰ نفر فقط ۵۵ نفر از طرح اعانه مدیر حمایت کردند. مقدار آماره آزمون برای آزمون $H_1: p \neq 0.6$ در مقابل $H_0: p = 0.6$ چقدر است؟

۱۲/۲۸ . ۴

-۵/۸۳ . ۳

-۱۲/۲۸ . ۲

. ۱ ۵/۸۳

-۴۸ فرض کنید $n = 11, \bar{x} = 5.4, s = 4.859$ در سطح اعتماد ۹۵٪، حدود اعتماد میانگین چقدر است؟

(۵۱/۵۴.۵۷/۶۷) . ۴

(۵۱/۱۵.۵۷/۲۸) . ۳

(۵۱/۱۵.۵۷/۶۷) . ۲

(۵۱/۵۴.۵۷/۲۸) . ۱

-۴۹ برای تعیین اثر یک سرم در بروترف سازی یک نوع بیماری دام، ۲۰۰ دام بیمار انتخاب و ۱۰۰ دام مورد تزریق قرار گرفته اند و اطلاعات زیر به دست آمده است. مقدار آماره آزمون برای آزمون اینکه آیا سرم در بهبودی دام اثری داشته است، چقدر است؟

بهبود نیافته	بهبود یافته	
۲۵	۷۵	تزریق شده
۳۵	۶۵	تزریق نشده

۳/۲۵ . ۴

۱/۵۷ . ۳

۱ . ۲

۲/۳۸ . ۱

www.nashr-estekhdam.ir

۴

۵

ستون درجه آزادی چقدر است؟

۹ . ۴

۱۲ . ۳

۲۰ . ۲

۲ . ۱

1	الف
2	د
3	الف
4	ب
5	د
6	ب
7	ج
8	الف
9	د
10	ب
11	ج
12	الف
13	الف
14	د
15	الف
16	ب
17	د
18	الف
19	ج
20	ب
21	الف
22	ج
23	الف
24	ج
25	الف
26	ج
27	ج
28	ب
29	الف
30	ج

۱- کدامیک از عبارات زیر معرف داده های گسسته می باشد؟

۲. سن یک شخص

. تعداد کودکان یک خانواده

۴. فشار خون

۳. سرعت یک اتومبیل به کیلومتر در ساعت

۲- دامنه تغییرات داده های زیر کدام گزینه است؟

۵,۱۵,۷,۲۲,۲۴,۱۱,۹,۲۵,۱۸

۵. ۴

۱۰. ۳

۲۰. ۲

۱۲. ۱

۳- متوسط دسته با فاصله $60 - 62$ برابر است با؟

۶۱. ۴

۵۵. ۳

۶۳. ۲

۵۸.

۴- هیستوگرام و پلی گن فراوانی، جهت نشان دادن نموداری کدام گزینه می باشد؟

۲. توزیع فراوانی

. توزیع فراوانی تجمعی نسبی

۴. توزیع فراوانی تجمعی

۳. توزیع فراوانی نسبی

www.nashr-estekhdam.ir

۵- میانه داده های $12, 10, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 10, 3$ برابر است با:

۶. ۴

۷. ۳

۸. ۲

۹.

۶- برای منحنی های فراوانی متقارن، میانگین، میانه و مد چه وضعیتی نسبت به هم دارند؟

۲. مدبین میانه و میانگین قرار دارد.

. میانه بین مد و میانگین قرار دارد.

۴. هر سه روی هم قرار می گیرند.

۳. میانگین بین مد و میانه قرار دارد.

۷- ریشه میانگین مربعات اعداد $1, 3, 4, 5, 7$ برابر است با:

۵. ۴

$\sqrt{25}$.

۴. ۲

$\sqrt{22}$.

۸- کدام گزینه رابطه بین میانگین حسابی، هندسی و هارمونیک دسته ای از اعداد مثبت را نشان می دهد؟

$G \leq \bar{X} \leq H$. ۴

$G \leq H \leq \bar{X}$. ۳

$H \leq \bar{X} \leq G$. ۲

$H \leq G \leq \bar{X}$.

۱۸ . ۴

۹ . ۳

۱۵ . ۲

۱۲ . ۱

۱۰- میانگین و انحراف معیار، قد یک گروه به ترتیب ۴۵ و ۱۸ است. ضریب تغییر قد آنها چند درصد است؟

۴۰ . ۴

۲۵ . ۳

۳۰ . ۲

۳۵ . ۱

۱۱- دامنه نیم چارک داخلی با کدام رابطه نشان داده می شود؟

$$\frac{Q_1 - Q_3}{3} . ۴$$

$$\frac{Q_1 - Q_3}{2} . ۳$$

$$\frac{Q_3 - Q_1}{2} . ۲$$

$$\frac{Q_3 - Q_2}{2} . ۱$$

۱۲- درجه عدم تقارن در یک توزیع چه نام دارد؟

۴. میانگین انحرافات

۳. کشیدگی

۲. گشتاور

۱. چولگی

۱۳- گشتاور سوم داده های ۲,۳,۷,۸,۱۰ کدام گزینه است؟

۲۴۱ . ۴

۳۷۸ . ۳

۳۳۱ . ۲

۲۴۵ . ۱

۱۴- اگر در جامعه ای نامتقارن، میانگین ۲۷۹ ، میانه ۲۷۷ و انحراف معیار ۱۵ باشد. ضریب دوم چولگی پیرسون برابر است با:

www.nashr-estekhdam.ir

۰/۱ . ۴

۰/۲ . ۳

۰/۴ . ۲

۰/۶ . ۱

۱۵- با توجه به جدول توزیع فراوانی زیر، میانگین کدام مقدار است؟

طبقات	فراوانی
۶/۵-۱/۵	۲
۱۱/۵-۶/۵	۵
۱۶/۵-۱۱/۵	۹
۲۱/۵-۱۶/۵	۴

۱۰/۲۵ . ۴

۱۳/۵ . ۳

۱۱ . ۲

۱۲/۷۵ . ۱

۱۶- به چند طریق می توان از بین ۱۰ کتاب متمایز، ۷ کتاب را انتخاب کرد؟

۸۰ . ۴

۶۰ . ۳

۱۲۰ . ۲

۱۸۰ . ۱

۱۷- ۵ نفر به چند طریق می توانند حول یک میز دایره ای شکل بشینند؟

۱۲۰ . ۴

۶۰ . ۳

۱۲ . ۲

۲۴ . ۱

۱۸- تعداد تبدیل های حروف statistics برابر است با:

۵۰۴۰۰ . ۴

۴۲۰۰ . ۳

۵۱۰۰ . ۲

۳۰۳۰۰ . ۱

۱۹- احتمال بدست آوردن ۲ شیر در ۶ پرتاب یک سکه متعادل کدام گزینه است؟

$\frac{5}{14} . ۴$

$\frac{5}{24} . ۳$

$\frac{15}{24} . ۲$

$\frac{15}{64} . ۱$

۲۰- کدام توزیع، میانگین و واریانس برابر دارد؟

۴. هندسی

۳. دوجمله ای

۲. پواسون

۱. فوق هندسی

۲۱- ۲۰ درصد از پیج و مهره تولید شده توسط ماشینی معیوب می باشد، اگر ۴ پیج و مهره انتخاب کنیم احتمال اینکه ۲ تای آنها معیوب باشد چقدر است؟

www.nashr-estekhdam.ir

۰/۴۰۹۶ . ۴

۰/۱۵۳۶ . ۳

۰/۱۲۱۴ . ۲

۰/۳۰۰۳ . ۱

۲۲- در یک امتحان ریاضی، میانگین ۷۲ و انحراف معیار ۱۵ است. نمره استاندارد دانشجویی که ۹۳ گرفته باشد کدام گزینه است؟

۱/۴ . ۴

۰ . ۳

۰/۸ . ۲

۱ . ۱

۲۳- احتمال مشروط شدن در یک دانشگاه ۰/۰۰۱ می باشد. احتمال اینکه ۲ نفر از بین ۲۰۰۰ نفر مشروط باشند چقدر است؟

$\frac{4}{e^3} . ۴$

$\frac{2}{e^2} . ۳$

$\frac{1}{e^2} . ۲$

$\frac{1}{e} . ۱$

-۲۴- در یک جدول تواافقی 6×5 ، درجه آزادی کدام است؟

۸ . ۴

۱۵ . ۳

۱۲ . ۲

۲۰ . ۱

-۲۵- برای آزمون یکنواختی میانگین افزایش وزن دو نژاد، اطلاعات زیر بدست آمده است. مقدار آماره آزمون برابر است با:

$$\left(n_1 = 7, n_2 = 6 \right) \left(s_2^2 = 250/22 \right) \left(s_1^2 = 351/64 \right) \left(\overline{X}_2 = 51/32 \right) \left(\overline{X}_1 = 46/37 \right)$$

.۰/۲۳۴ . ۴

-۰/۵۱۶ . ۳

-۰/۴۱۲ . ۲

.۰/۴۰۴ . ۱

-۲۶- در یک آزمون آماری، اشتباہ نوع اول ۵ درصد و اشتباہ نوع دوم ۶ درصد است. اعتبار آزمون چند درصد است؟

۹۱ . ۴

۹۴ . ۳

۹۵ . ۲

۹۳ . ۱

-۲۷- در ۶۰ بار آزمایش یک سکه سالم، میانگین و واریانس تعداد خط رو شده برابر است با:

$$\mu = 30, \sigma^2 = 15$$

$$\mu = 20, \sigma^2 = 15$$

$$\mu = 20, \sigma^2 = 25$$

$$\mu = 40, \sigma^2 = 25$$

-۲۸- در توزیع دو جمله‌ای با $n = 20, p = 0.2$ امید ریاضی چقدر است؟

۱/۶ . ۴

۱۶ . ۳

.۲

.۰/۴ . ۱

www.nashr-estekhdam.ir

۴

-۲۹- در یک شبانه روز، ۴۸ تلفن به مرکز اورژانس می‌شود. اگر تماس تلفن‌ها از توزیع پواسن باشند احتمال آنکه بین ساعت ۸ تا ۱۰ صبح، هیچ تلفنی زده نشود کدام گزینه است؟

e^{-4} . ۴

$2e^{-4}$. ۳

$2e^4$. ۲

e^2 . ۱

-۳۰- در کیسه‌ای ۴ مهره سفید و ۵ مهره آبی وجود دارد. دو مهره به تصادف از درون آن بیرون می‌آوریم، احتمال آنکه دو مهره سفید نباشند برابر است با:

$\frac{1}{3}$. ۴

$\frac{1}{6}$. ۳

$\frac{2}{3}$. ۲

۵ . ۱
6

1	الف
2	بـ
3	د
4	بـ
5	بـ
6	د
7	الف
8	الف
9	بـ
10	د
11	بـ
12	الف
13	ج
14	بـ
15	الف
16	بـ
17	الف
18	د
19	الف
20	بـ
21	ج
22	د
23	ج
24	الف
25	ج
26	ج
27	بـ
28	بـ
29	د
30	الف

- اگر در نمودار دایره‌ای اندازه زایه ۸۲ درجه باشد، فراوانی نسبی مربوطه چقدر است؟

۳۰،۳ . ۴

۲۷ . ۳

۰/۲۳ . ۲

۰/۲۷ .

- جدول زیر فراوانی وزن ۱۰۰ دانشجو را نشان میدهد، فراوانی دسته ۶۶-۶۸ چقدر است؟

وزن	۶۲-۶۰	۶۵-۶۳	۶۸-۶۶	۷۱-۶۹	۷۴-۴۲
دانشجویان	۱۹	۲۰	؟	۲۴	۱۸

۰،۱۹ . ۴

۴۲ . ۳

۱۹ . ۲

۰،۴۲ . ۱

- اگر بزرگترین داده ۷۴ و کوچکترین داده ۶۰ و تعداد دسته‌ها ۷ باشد، فاصله دسته چقدر است؟

۶۷ . ۴

۲ . ۳

۵ . ۲

۱۴ .

- میانه داده‌های ۳-۱۰-۴-۶-۸-۸-۵-۴-۶-۸-۳ چقدر است؟

۶ . ۴

۸ . ۳

۳ . ۲

۷ .

- مد داده‌های ۹-۷-۷-۷-۷-۴-۴-۴-۴-۵-۵-۵-۴-۴-۳-۴-۴-۴-۵ کدام است؟

۴ و ۷ . ۴

۵/۵ . ۳

۴ . ۲

۷ .

www.nashr-estekhdam.ir

- کدام گزینه درست است؟

$\bar{X} < G < H$. ۴

$G < \bar{X} < H$. ۳

$G < H < \bar{X}$. ۲

$H < G < \bar{X}$.

- میانگین داده‌های جدول فراوانی زیر چقدر است؟

دسته	۶۲-۶۰	۶۵-۶۳	۶۸-۶۶	۷۱-۶۹	۷۴-۴۲
فراوانی	۵	۱۸	۴۲	۲۷	۸

۶۸/۰۵ . ۴

۲۰ . ۳

۶۷/۴۵ . ۲

۶۵/۱ . ۱

- در جدول فراوانی زیر میانه چقدر است؟

دسته	۱۲۶-۱۱۸	۱۳۵-۲۷	۱۴۴-۱۳۶	۱۵۳-۱۴۵	۱۶۲-۱۵۴
فراوانی	۳	۵	۹	۱۲	۱۱

۱۴۴ . ۴

۱۴۶/۸ . ۳

۱۴۸/۳ . ۲

۱۴۵ . ۱

- میانگین انحرافات دسته ۲-۳-۶-۸-۱۱ چقدر است؟

۱۴ . ۴

۰ . ۳

۲/۸ . ۲

۶ . ۱

- اگر دامنه نیمه چارک داخلی $Q_3 = 26.5, Q_1 = 13.25$ ۱۰

۱۹/۸۸ . ۴

۳۹/۷۵ . ۳

۱۳/۲۵ . ۲

۶/۶۳ . ۱

- در جدول فراوانی زیر انحراف معیار چقدر است؟ ۱۱

متوسط دسته	۶۱	۶۴	۶۷	۷۰	۷۳
فراوانی	۵	۱۸	۴۲	۲۷	۸

۳/۱ . ۴

۲/۹۲ . ۳
www.nashr-estekhdam.ir

۹/۵ . ۲

۸/۵۳ . ۱

- اگر $\bar{X} = 295, S^2 = 225$ باشد، ضریب تغییرات چقدر است؟ ۱۲

۱۹/۸۷ . ۴

۱/۳ . ۳

۰/۷۶ . ۲

۰/۰۵ . ۱

- فرض کنید میانگین یک سری داده $279/77$ ، مد داده ها $277/5$ و واریانس داده ها $243/36$ باشد. ضریب اول چولگی پیرسون چقدر است؟ ۱۳

۱۶ . ۴

۱۴ . ۳

۰/۱۴ . ۲

۰/۱۶ . ۱

- اگر $m_3' = 857.0667, m_2' = 113.4667, m_1' = 1.9667$ باشد، آنگاه m_2' چقدر است؟ ۱۴

۲۵۶۲۷/۲۸۵۴ . ۴

۲۰۲/۸۱۵۸ . ۳

۱۰۹/۵۹۸۸ . ۲

۲۰۳.۸۱۵۸ . ۱

۱۵- از بین ۶ توپ قرمز، ۴ توپ سفید و ۵ توپ آبی یک توپ به تصادف انتخاب میشود. احتمال این که توپ قرمز یا سفید باشد چقدر است؟

$$\frac{10}{15} . 4$$

$$\frac{4}{15} . 3$$

$$\frac{6}{15} . 2$$

$$\frac{5}{15} . 1$$

۱۶- دو کارت از یک دسته کارت ۵۲ تایی که شامل ۴ رنگ و از ۱ تا ۱۳ شماره گذاری شده اند، انتخاب میشود. احتمال این که هر دو کارت شماره ۱۰ باشند چقدر است؟(بون جایگذاری)

$$\frac{16}{2704} . 4$$

$$\frac{16}{2652} . 3$$

$$\frac{12}{2704} . 2$$

$$\frac{12}{2652} . 1$$

www.nashr-estekhdam.ir

۱۷- در جدول توزیع احتمال زیر امید ریاضی X چقدر است؟

x	.	1	2	3
f(x)	.1/1	.1/3	?	.1/4

۱۸- نمیتوان محاسبه کرد.

$$1 . 3$$

$$1/9 . 2$$

$$1/5 . 1$$

۱۸- به چند طریق ۵ مرد و ۴ زن در یک ردیف مینشینند به طوری که ابتدا زنها پشت سر هم بنشینند؟

$$2880 . 4$$

$$20 . 3$$

$$24 . 2$$

$$120 . 1$$

۱۹- احتمال این که در ۵ آزمایش یک تاس متعادل، حداقل یکبار ۳ بیاید چقدر است؟

$$1 - 5\left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{5}{6}\right)^4 . 4$$

$$5\left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{5}{6}\right)^4 . 3$$

$$1 - \left(\frac{5}{6}\right)^5 . 2$$

$$\left(\frac{5}{6}\right)^5 . 1$$

۲۰- متوسط زمانی که یک دانشجو برای حل یک تمرین صرف میکنند ۱۵۱ ثانیه و انحراف معیار ۱۵ ثانیه ایست. با فرض نرمال بودن زمان، از بین ۵۰۰ دانشجو چند دانشجو بین ۱۲۰ تا ۱۵۵ ثانیه زمان صرف میکنند؟

$$200 . 4$$

$$300 . 3$$

$$0/4 . 2$$

$$0/6 . 1$$

-۲۱- تاسی ۱۲۰ بار پرتاب میشود. احتمال این که حداقل ۱۸ بار شماره ۴ ظاهر شود چقدر است؟

$$0.8557 \cdot 4$$

$$0.1443 \cdot 3$$

$$0.3557 \cdot 2$$

$$0.5 \cdot 1$$

-۲۲- در صورتی که احتمال رنج بردن یک فرد از عکس العمل بد در مقابل تزریق سرم معینی ۱/۰۰ باشد، احتمال این که از ۲۰۰۰ نفر دقیقاً ۳ نفر از این عکس العمل بد رنج ببرند چقدر است؟

$$\frac{4}{3}e^{-0.001} \cdot 4$$

$$\frac{3}{4}e^{-2} \cdot 3$$

$$e^{-2} \cdot 2$$

$$\frac{4}{3}e^{-2} \cdot 1$$

-۲۳- کدام گزینه درست است؟

۱. اشتباه نوع اول عبارتست از رد کردن فرض صفر وقتی که غلط است.

۲. اشتباه نوع دوم عبارتست از رد کردن فرض صفر وقتی که درست است.

۳. اشتباه نوع اول عبارتست از پذیرفتن فرض صفر وقتی که غلط است.

۴. اشتباه نوع دوم عبارتست از پذیرفتن فرض صفر وقتی که غلط است.

www.nashr-estekhdam.ir

-۲۴- اگر $\alpha = 0.02, \beta = 0.2$ باشد اعتبار آزمون چقدر است؟

$$0.18 \cdot 4$$

$$0.98 \cdot 3$$

$$0.8 \cdot 2$$

$$0.08 \cdot 1$$

-۲۵- برای آزمون ۴۰ $H_0: \mu = 40$ در مقابل $H_1: \mu \neq 40$ یک نمونه ۱۸ تایی انتخاب و مقادیر $S^2 = 0.633, \bar{X} = 37.206$ به دست آمده است. مقدار آماره آزمون چقدر است؟

$$11/85 \cdot 4$$

$$-11/85 \cdot 3$$

$$14/89 \cdot 2$$

$$-14/89 \cdot 1$$

-۲۶- با توجه به اطلاعات زیر S_D چقدر است؟

$$\sum x_{1i} = 5421, \sum x_{2i} = 254358, n_1 = 12$$

$$\sum x_{3i} = 5801, \sum x_{4i} = 2859497, n_2 = 12$$

$$6811/06 \cdot 4$$

$$76/46 \cdot 3$$

$$82/53 \cdot 2$$

$$5845/5 \cdot 1$$

-۴۷- برای آزمون تخمین مدیر که 60 درصد از کارکنان از طرح اعانه جدید حمایت میکنند، یک نمونه 150 نفری از کارکنان انتخاب شده و 55 نفر از آنها از طرح اعانه جدید حمایت کردند. مقدار آماره آزمون برای آزمون $H_0 : p = 0.6$ در مقابل $H_1 : p \neq 0.6$ چقدر است؟

-۰/۳۶۷ . ۴

-۵/۸۲۵ . ۳

۵/۸۲۵ . ۲

.۰/۳۶۷ . ۱

-۴۸- برای آزمون $H_0 : \sigma^2 = 676$ در مقابل $H_1 : \sigma^2 > 676$ ، از یک نمونه 20 تایی انحراف معیار $34/79$ بدست آمده است. مقدار آماره آزمون برای آزمون فوق چقدر است؟

۳۰/۱۴ . ۴

۲۳۰۰۰ . ۳

۳۴/۰۲ . ۲

۱۹ . ۱

-۴۹- در یک جدول توافقی 5×6 درجه آزادی چقدر است؟

۹ . ۴

۱۱ . ۳

۲۰ . ۲

۳۰ . ۱

-۵۰- در جدول توافقی زیر مقدار آماره آزمون کی دو چقدر است؟(بدون تصحیح)

www.nashr-estekhdam.ir

بهمبود نیافته	بهمبود یافته	
۲۵	۷۵	تزریق شده
۳۵	۶۵	تزریق نشده

۳/۷۵ . ۴

۲۵ . ۳

۲/۳۸ . ۲

۳۰ . ۱

1	الف
2	الف
3	الف
4	الف
5	الف
6	الف
7	الف
8	الف
9	الف
10	الف
11	الف
12	الف
13	الف
14	الف
15	الف
16	الف
17	الف
18	الف
19	الف
20	الف
21	الف
22	الف
23	الف
24	الف
25	الف
26	الف
27	الف
28	الف
29	الف
30	الف

۱- نموداری که نشان دهنده فراوانی تجمعی کمتر از حد بالای هر دسته نسبت به فراوانی تجمعی رسم می شود، چه نام دارد؟

۴. چنبره فراوانی

۳. پلی گن فراوانی

۲. طاقوار

۱. هیستوگرام

۲- کدام گزینه صفت کمی پیوسته است؟

۱. تعداد افراد خانواده

۲. گروه خونی

۴. ظرفیت یک بطری آب

۳. تعداد دانشجویان یک دانشگاه

۳- مرحله ای از آمار که نتایج مهم در مورد جامعه غالباً می تواند از تجزیه نمونه استنباط شود، چه نام دارد؟

۴. آمار قیاسی

۳. آمار تعمیمی

۲. آمار توصیفی

۱. نمونه گیری

۴- ۴۵۳۰۰ چند رقم مهم دارد؟

۱. ۴

۴. ۳

۳. ۲

۵. ۱

www.nashr-estekhdam.ir

۵- میانه دسته اعداد ۷۸، ۸۷، ۹۱، ۶۸، ۷۲ کدام گزینه است؟

۷۲. ۴

۷۸. ۳

۸۰. ۲

۸۱. ۱

۶- بزرگترین و کوچکترین داده آماری در یک آزمایش ۴۲۴ و ۳۶۰ می باشند. اگر ۸ طبقه مورد استفاده قرار گیرد، فاصله طبقات چقدر است؟

۶. ۴

۸. ۳

۷. ۲

۴. ۱

-۷- با توجه به جدول فراوانی زیر مقدار میانگین حسابی چقدر است؟

طبقات	فراوانی
۹/۵-۱/۵	۳
۱۷/۵-۹/۵	۷
۲۵/۵-۱۷/۵	۶
۳۳/۵-۲۵/۵	۴

۱۵/۳ . ۴

۲۱/۴ . ۳

۱۶ . ۲

۱۷/۹ . ۱

-۸- با توجه به جدول فراوانی زیر مقدار مد(نما) چقدر است؟

www.nashr-estekhdam.ir

طبقات	فراوانی
۹/۵-۱/۵	۳
۱۷/۵-۹/۵	۷
۲۵/۵-۱۷/۵	۶
۳۳/۵-۲۵/۵	۴

۹/۵ . ۴

۱۴/۵ . ۳

۱۵/۹ . ۲

۱۰/۷ . ۱

-۹- میانگین هندسی اعداد ۴ ، ۲ و ۸ برابر است با؟

۳ . ۴

۶ . ۳

۰ . ۲

۴ . ۱

-۱۰- در یک نمونه گیری کدامیک از میانگین ها قابل اطمینان تر است؟

۲. میانگین هندسی

۱. میانگین حسابی

۴. ریشه میانگین مربعات

۳. میانگین هارمونیک

۱۱- انحراف معیار اعداد ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۷، ۶، ۳، ۱۰، ۱۸ و ۵ کدام گزینه است؟

۴/۸۷ . ۴

۲/۲۵ . ۳

۳/۳۴ . ۲

۵/۲۱ . ۱

۱۲- با توجه به جدول زیر دامنه انحرافات چارکی برابر است با:

طبقات	فراوانی
۶۲-۶۰	۵
۶۵-۶۳	۱۸
۶۸-۶۶	۴۲
۷۱-۶۹	۲۷
۷۴-۷۲	۸

۴ . ۴

۱/۹۸ . ۳

۳ . ۲

۲/۶۷ . ۱

۱۳- چارک دوم برابر است با:

۴. میانگین

۲. میانه
www.nashr-estekhdam.ir

۱. واریانس

۱۴- اگر میانگین و انحراف معیار دسته‌ای از اعداد به ترتیب برابر با ۱۵/۲۳ و ۶۰/۹۲ باشند آنگاه ضریب تغییرات کدام گزینه است؟

۴ . ۴

۴/۲۵ . ۳

۵ . ۲

۵/۴۴ . ۱

۱۵- گشتاور دوم داده‌های ۱۰، ۸، ۷، ۳ و ۲ نسبت به میانگین برابر است با:

۶/۶ . ۴

۹/۲ . ۳

۸/۵ . ۲

۴/۳ . ۱

۱۶- کدام رابطه ضریب دوم چولگی پیرسون را نشان می‌دهد؟

$$\frac{\bar{x} - M_d}{s^2} . ۴$$

$$\frac{\bar{x} - M_d}{s} . ۳$$

$$\frac{\bar{x} + M_d}{s^2} . ۲$$

$$3\left(\frac{\bar{x} - M}{s}\right) . ۱$$

۱۷- اگر گشتاور مرتبه چهارم حول میانگین برابر ۱۲۰ و واریانس ۲ باشد، ضریب گشتاوری کشیدگی کدام گزینه است؟

۲۰. ۴

۲۵. ۳

۳۰. ۲

۴۵. ۱

۱۸- به چند طریق ۶ نفر می توانند به ترتیب در دو گروه ۴ و ۲ تایی قرار گیرند؟

۶۰. ۴

۲۱۰. ۳

۱۲۰. ۲

۸۰. ۱

۱۹- به چند طریق می توان از بین ۵ مرد و ۴ زن یک گروه ۶ نفره تشکیل داد بطوریکه تعداد زن و مردها باهم برابر باشند؟

۴۰. ۴

۳۵. ۳

۲۵. ۲

۱۰. ۱

۲۰- تعداد تبدیل های حروف ایرانیان برابر است با:

۱۷۹۳. ۴

۵۸۶. ۳

۱۲۴۵. ۲

۱۶۸۰. ۱

۲۱- ۲۰ درصد پیج و مهره های تولیدی یک ماشین، معیوب می باشند. ۴ پیج و مهره به طور تصادفی انتخاب میکنیم، احتمال اینکه یکی از آنها معیوب باشد چقدر است؟

۰/۲۳۲۰. ۴

۰/۴۰۹۶. ۳

۰/۳۴۵. ۲

۰/۵۰۴. ۱

۲۲- اگر نمره استاندارد یک دانشجو در امتحان درس آمار برابر صفر باشد. با فرض میانگین ۷۲ و انحراف معیار ۱۵ ، نمره(خام) دانشجو چند بوده است؟ www.nashr-estekhdam.ir

۷۲. ۴

۰. ۳

۳۶. ۲

۴۸. ۱

۲۳- در ۱۴۴ بار آزمایش یک سکه سالم، میانگین و انحراف معیار تعداد خط های ظاهر شده برابر است با:

$\mu = 64, \sigma = 6$

$\mu = 72, \sigma = 36$

$\mu = 72, \sigma = 6$

$\mu = 64, \sigma = 36$

۲۴- در صورتیکه احتمال رنج بردن یک فرد از عکس العمل بد در مقابل تزریق سرم معینی ۱/۰۰۰ باشد، احتمال اینکه از ۲۰۰۰ نفر فقط ۳ نفر از این عکس العمل بد رنج ببرند برابر است با:

$\frac{1}{3e}$

$\frac{4}{3e^2}$

$\frac{2}{e^3}$

$\frac{4}{3e}$

-۲۵- در جعبه‌ای ۵ مهره سفید و ۴ مهره آبی وجود دارد. دو مهره متواالیاً و بدون جایگذاری از داخل این جعبه بیرون می‌آوریم، احتمال سفید بودن آنها برابر است با:

$$\frac{5}{18} \cdot 4$$

$$\frac{4}{15} \cdot 3$$

$$\frac{2}{9} \cdot 2$$

$$\frac{3}{8} \cdot 1$$

-۲۶- در یک جدول توافقی 5×4 درجه آزادی کدام است؟

$$15 \cdot 4$$

$$20 \cdot 3$$

$$12 \cdot 2$$

$$12 \cdot 1$$

-۲۷- اشتباه نوع دوم برابر است با:

۲. همان اشتباه نوع اول است.

۱. پذیرش فرض صفر وقتی که غلط است.

۴. رد فرض صفر وقتی که غلط است.

۳. رد فرض صفر وقتی که صحیح است.

-۲۸- در ۳۶۰ آزمایش یک جفت تاس، ۷۴ مرتبه ۷ و ۲۴ مرتبه ۱۱ مشاهده شد. برای بررسی متعادل بودن تاس‌ها، مقدار آماره آزمون برابر است با:

www.nashr-estekhdam.ir

$$2/24 \cdot 4$$

$$4/07 \cdot 3$$

$$5/01 \cdot 2$$

$$3/11 \cdot 1$$

-۲۹- میانگین و انحراف معیار آزمون نرمال، کدام گزینه است؟

$$\mu = 1, \sigma^2 = 1 \cdot 4$$

$$\mu = 0, \sigma^2 = 0 \cdot 3$$

$$\mu = 0, \sigma^2 = 1 \cdot 2$$

$$\mu = 1, \sigma^2 = 0 \cdot 1$$

-۳۰- اندازه یک آزمون کدام گزینه است؟

۲. احتمال رد شدن فرض صفر، وقتی که علاوه‌غلط است.

۱. احتمال رد شدن فرض صفر، وقتی که صحیح است.

۴. احتمال قبول شدن فرض صفر، وقتی که غلط است.

۳. احتمال قبول شدن فرض صفر، وقتی که صحیح است.

1	بـ
2	دـ
3	دـ
4	الفـ
5	الفـ
6	جـ
7	الفـ
8	بـ
9	الفـ
10	الفـ
11	دـ
12	جـ
13	بـ
14	دـ
15	جـ
16	الفـ
17	بـ
18	جـ
19	دـ
20	الفـ
21	جـ
22	دـ
23	بـ
24	جـ
25	دـ
26	الفـ
27	الفـ
28	جـ
29	بـ
30	الفـ

۱- داده های مربوط به تعداد افراد خانواده کدام است؟

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| ۲. داده های رتبه ای | ۱. داده های شمارشی |
| ۴. داده های رده بندی شده | ۳. داده های اندازه گیری شده |

۲- اطلاعات مربوط به تمام متغیرها برای یک عنصر از مجموعه داده ها را چه می نامند؟

- | | | | |
|----------|----------|---------|-----------|
| ۴. برآمد | ۳. جامعه | ۲. مورد | ۱. مشاهده |
|----------|----------|---------|-----------|

۳- کدام یک از گزینه های زیر جزء داده های رده بندی شده می باشد؟

- | | |
|---|--|
| ۲. داده های مربوط به جنس دانشجویان یک کلاس | ۱. داده های مربوط به تعداد دانشجویان یک کلاس |
| ۴. داده های مربوط به معدل دانشجویان یک کلاس | ۳. داده های مربوط به وزن دانشجویان یک کلاس |

۴- روشایی که با استفاده از آنها اطلاعات موجود در نمونه به کل جامعه تعمیم داده می شود را چه می نامند؟

- | | |
|----------------------------|------------------|
| ۲. روشایی رده بندی داده ها | ۱. آمار توصیفی |
| ۴. آمار استنباطی | ۳. نمایش داده ها |

۵- آخرین مرحله انجام استنباط آماری کدام است؟

- | | |
|---|--------------------------------|
| ۱. به دست آوردن نتایج در مورد جامعه
www.nashr-estekhdam.ir | ۲. تجزیه و تحلیل اطلاعات نمونه |
| ۳. بیان میزان اطمینان به استنباط انجام شده در قالب معیار عددی | ۴. جمع آوری داده ها |

۶- اختلاف بین حد بالا و حد پایین یک رده را چه می نامند؟

- | | | | |
|----------------|------------|--------------|------------|
| ۴. فراوانی رده | ۳. عرض رده | ۲. تعداد رده | ۱. طول رده |
|----------------|------------|--------------|------------|

۷- فراوانی تجمعی رده i ام برابر است با:

- | | |
|--|--|
| ۲. نسبت فراوانی رده i ام بر تعداد کل داده ها | ۱. مجموع فراوانی رده های ۱ تا i |
| ۴. تعداد داده های طبقه i ام | ۳. مجموع فراوانی نسبی رده های ۱ تا i |

۸- در بافت نگار فراوانی، محور افقی نشان دهنده چیست؟

- | | | | |
|------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| ۴. فراوانی نسبی رده ها | ۳. عرض رده ها | ۲. فراوانی رده ها | ۱. حدود رده ها |
|------------------------|---------------|-------------------|----------------|

۹- کدام یک از گزینه های زیر یک اندازه گرایش به مرکز است؟

۴. واریانس

۳. دامنه مقداری

۲. مد

۱. انحراف معیار

۱۰- اگر در یک توزیع مد $<$ میانگین باشد، آنگاه:

۲. توزیع متقارن است.
۴. توزیع چوله به چپ است.

۱. توزیع چوله به راست است.

۳. در مورد توزیع نمی توان نظر داد.

۱۱- واریانس داده های ۴, ۷, ۱, ۲, ۵ را بدست آورید؟

۶, ۱ . ۴

۵, ۷ . ۳

۳, ۸ . ۲

۴, ۲ . ۱

۱۲- در امتحانی که از ۲۵ کارمند منتخب گرفته شده، مشاهده شده است که میانگین نمرات ۷۵ و واریانس نمرات ۱۰۰ است. با استفاده قضیه چیبیشف توزیع نمرات به ازای $k = ۲$ به چه صورت است؟

۱. حداقل $\frac{۳}{۴}$ نمرات در بازه $(۱۰۵, ۴۵)$ قرار می گیرند.

۲. حداقل $\frac{۳}{۴}$ نمرات در بازه $(۵۵, ۹۵)$ قرار می گیرند.

۳. حداقل $\frac{۸}{۹}$ نمرات در بازه $(۵۵, ۹۵)$ قرار می گیرند.

۴. حداقل $\frac{۸}{۹}$ نمرات در بازه $(۱۰۵, ۴۵)$ قرار می گیرند.
www.nashr-estekhdam.ir

۱۳- یک قفسه شامل ۵ کتاب مختلف می باشد. چند زوج از کتابها را می توان به صورت مرتب شده انتخاب کرد؟

۵ . ۴

۱۵ . ۳

۱۰ . ۲

۲۰ . ۱

۱۴- متغیر تصادفی X دارای میانگین ۵ و واریانس ۴ است. انحراف معیار $-2X - Y$ را بیابید؟

۴. صفر

۸ . ۳

۲ . ۲

۴ . ۱

۱۵- دو پیشامد ناتهی A و B را مستقل از هم می گویند هرگاه:

$$P(A | B) = P(B) \quad . ۲$$

$$P(A | B) = P(A)P(B) \quad . ۱$$

$$P(A | B) = P(A) \quad . ۴$$

$$P(A | B) = P(AB) \quad . ۳$$

۱۶- یک قطعه از پنج قسمت تشکیل شده و این قسمتها را می توان به هر ترتیبی در کنار هم قرار داد. طی یک آزمون می خواهیم زمان لازم برای قرار دادن این قسمتها در کنار هم را اندازه بگیریم. اگر هر حالت خاص از قرار گرفتن این پنج قسمت در کنار هم، یکبار آزمون شود چند بار این آزمون باید انجام شود؟

۴۰. ۴

۲۴. ۳

۱۲۰. ۲

۶۰. ۱

۱۷- تعداد گروههای ۵ نفری انتخاب شده از میان ۲۰ نفر کدام است؟

$$\frac{20!}{5!15!} \cdot 4$$

$$\frac{20!}{5!} \cdot 3$$

$$\frac{20!}{15!} \cdot 2$$

$$\frac{20!5!}{15!} \cdot 1$$

۱۸- کدام یک از گزینه های زیر بیانگر یک متغیر تصادفی پیوسته است؟

۲. تعداد تصادفات رانندگی در هر هفته

۱. تعداد اتومبیل هایی که در هر ماه فروخته می شود.

۴. تعداد مشتریانی که در صفحه صندوق یک فروشگاه هستند.

۳. مقدار اکسیدکربن موجود در یک متر مکعب از هوا

۱۹- در توزیع نرمال، چند درصد مشاهدات حداقل برابر میانگین می باشند؟

۰/۹۹. ۴

۰/۹۵. ۳

۰/۵. ۲

۰/۲۵. ۱

۲۰- اگر آزمایشی شامل انتخاب n شیء از میان N شیء با جایگذاری باشد و تعداد اشیایی که دارای خاصیت یکسانی هستند موردنظر باشد، در این صورت آزمایش انجام شده کدام است؟

۴. فوق هندسی

۳. پواسن

۲. برنولی

۱. دوجمله ای

۲۱- فرض کنید متغیر تصادفی X توزیع دوجمله ای با پارامترهای $p = 0/7$ و $n = 4$ داشته باشد. در این صورت ($P(X = 0) = 0/009$) کدام است؟

www.nashr-estekhdam.ir

۰/۸۱. ۴

۰/۰۹. ۳

۰/۰۰۸۱. ۲

۰/۰۰۹. ۱

۲۲- در یک بانک بطور متوسط ۷ نفر حساب خود را در یک سال می بندند. فرض کنید تعداد کسانی که در یک دوره زمانی خاص حساب خود را می بندند توزیع پواسن داشته باشند. احتمال اینکه در یک دوره ۴ ماهه هیچکس حساب خود را نبندد، چقدر است؟

$$e^{-2.3} \cdot 4$$

$$e^{-1.3} \cdot 3$$

$$e^{2.3} \cdot 2$$

$$e^{1.3} \cdot 1$$

۲۳- فرض کنید X یک متغیر تصادفی دوجمله ای با پارامترهای $n = 5000$ و $p = 0.001$ باشد. در این صورت کدام توزیع تقریب خوبی برای توزیع دوجمله ای است؟

۴. پواسن

۳. نمایی

۲. فوق هندسی

۱. نرمال

۲۴- مقدار $p(0 < Z < Z_{0.025})$ را بیابید؟

۰.۵۲۵ .۴

۰.۰۲۵ .۳

۰.۴۷۵ .۲

۰.۱ .۱

۲۵- اگر نسبت واقعی موفقیت در جامعه $p = 0.5$ باشد و از این جامعه یک نمونه ۱۰۰ تایی انتخاب کنیم، احتمال $(p \leq 0.38)$ احتمال کنیم، احتمال $(p \leq 0.38)$

www.nashr-estekhdam.ir

برابر با کدام یک از احتمالات زیر است؟

$P(Z \geq 1/\varphi) .4$

$P(Z < -1/\varphi) .3$

$P(Z < 2/\varphi) .2$

$P(Z \leq -2/\varphi) .1$

الف

1

ب

2

ب.

3

د

4

ج

5

ج

6

الف

7

الف

8

ب

9

د

10

ج

11

ب

12

الف

13

د

14

ب

15

ب.

16

د

17

ب

18

الف

19

۱- وزن محصولات تولید شده در یک کارخانه دارای چه مقیاسی است؟

۴. نسبتی

۳. اسمی

۲. فاصله ای و رتبه ای

۱. رتبه ای

۴- اگر میانگین x_1, x_2, \dots, x_n برابر با \bar{x} باشد مقدار $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})$ کدام است؟

n . ۴

n \bar{x} . ۳

۲. صفر

۱. یک

۳- واریانس نمونه ای مشاهدات ۳۲ و ۲۵ و ۱۰ و ۱۸ و ۱۵ برابر است با:

۳۴,۵ . ۴

۱۸ . ۳

۲۲ . ۲

۳۲,۵ . ۱

۴- اگر از نمرات دانشجویی سه نمره کم کنیم، انحراف معیار نمرات دانشجو چه تغییری می کند؟

۲. تغییری نمی کند

۱. واحد کم می شود

۴. سه واحد کم می شود

۳. بر سه تقسیم می شود

۵- اگر رابطه $Md > M\bar{a}$ برقرار باشد توزیع فراوانی چگونه است؟

۴. چولگی مناسب

۳. توزیع متقارن است

۲. چوله به راست است

۱. چوله به چپ است

۶- اگر میانگین نمرات ۲۵ دانشجو برابر ۱۸ و واریانس نمرات ۲۵ باشد حداقل $\frac{8}{9}$ از مشاهدات در چه بازه ای قرار می گیرند؟

www.nashr-estekhdam.ir

۴. (۳۳و۳)

(۱۳و۲۳)

۲. (۱۵و۲۱)

۱. (۸و۲۸)

۷- در جدول زیر میانه مشاهدات برابر است با:

طبقات	۱۰-۲۰	۲۰-۳۰	۳۰-۴۰	۴۰-۵۰
فراوانی	۸	۴۰	۳۰	۲۲

۴. ۲۶,۶۷

۳۳,۳۳ . ۳

۳۱,۳ . ۲

۳۰,۶۷ . ۱

-۸ در جدول زیر میانه مشاهدات برابر است با:

طبقات	۱۰-۲۰	۲۰-۳۰	۳۰-۴۰	۴۰-۵۰
فراوانی	۸	۴۰	۳۰	۲۲

مقدار مذکور(نما) کدام است؟

$$22.5 \cdot 4$$

$$35 \cdot 3$$

$$30 \cdot 2$$

$$25 \cdot 1$$

-۹ از بین ۹ نفر شرکت کننده در جلسه ای به چند طریق بترتیب می توان یک رئیس ، یک معاون و یک منشی انتخاب کنیم ؟

$$560 \cdot 4$$

$$72 \cdot 3$$

$$84 \cdot 2$$

$$504 \cdot 1$$

-۱۰ اگر $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ ، $P(A') = \frac{2}{3}$ ، $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$ باشد، مقدار $P(B)$ کدام است ؟

$$\frac{3}{4} \cdot 4$$

$$\frac{2}{3} \cdot 3$$

$$\frac{1}{4} \cdot 2$$

$$\frac{1}{3} \cdot 1$$

-۱۱ با توجه به جدول رو به رو $P(D | B)$ برابر است با :

D	C	
.0.2	.0.4	A
.0.32	.0.08	B

www.nashr-estekhdam.ir

$$0.32 \cdot 4$$

$$0.4 \cdot 3$$

$$0.8 \cdot 2$$

$$0.7 \cdot 1$$

-۱۲ خانواده ای دارای ۳ فرزند هستند احتمال اینکه دو دختر و یک پسر باشد چقدر است؟(احتمال پسر و دختر برابرد)

$$\frac{3}{8} \cdot 4$$

$$\frac{2}{8} \cdot 3$$

$$\frac{1}{8} \cdot 2$$

$$\frac{4}{8} \cdot 1$$

-۱۳ در ظرفی ۴ مهره سفید و ۵ مهره سیاه وجود دارد به تصادف دو مهره از آن انتخاب می کنیم احتمال اینکه هر دو مهره همنگ باشند چقدر است ؟

$$\frac{2}{9} \cdot 4$$

$$\frac{5}{18} \cdot 3$$

$$\frac{4}{9} \cdot 2$$

$$\frac{1}{6} \cdot 1$$

-۱۴ اگر $P(A \cap B) = \frac{1}{3}$ باشد مقدار $P(B | A)$ کدام است؟

$$\frac{1}{7} . ۴$$

$$\frac{1}{3} . ۳$$

$$\frac{3}{14} . ۲$$

$$\frac{1}{14} . ۱$$

-۱۵ اگر A، B دو پیشامد ناسازگار و $P(B) = 0.5$ ، $P(A) = 0.4$ باشد کدام یک نادرست است؟

$$P(A \cap B) = 0.2 . ۲$$

$$P(A \cap B) = 0 . ۱$$

$$P(A') = 0.6 . ۴$$

$$P(A \cup B) = 0.9 . ۳$$

-۱۶ گر A، B دو پیشامد مستقل و $P(B) = 0.5$ ، $P(A) = 0.4$ باشد احتمال اجتماع دو پیشامد برابر است با :

$$0.9 . ۴$$

$$0.7 . ۳$$

$$0.6 . ۲$$

$$0.8 . ۱$$

-۱۷ در جدول توزیع احتمال زیر مقدار K چقدر می باشد؟

X	-2	-1	2	3
$P(x)$	0.3	$2K-1$	0.2	0.1

$$0.3 . ۴$$

$$0.4 . ۳$$

$$0.7 . ۲$$

$$0.8 . ۱$$

www.nashr-estekhdam.ir

-۱۸ در جدول توزیع احتمال زیر میانگین متغیر تصادفی X کدام است؟

X	-2	-1	2	3
$P(x)$	0.3	$2K-1$	0.2	0.1

$$0.9 . ۴$$

$$1.7 . ۳$$

$$0.3 . ۲$$

$$-0.3 . ۱$$

-۱۹ اگر متغیر تصادفی X دارای میانگین ۴ و واریانس ۴۹ باشد آنگاه میانگین و انحراف معیار $y=3x+2$ ترتیب کدام است؟

$$23 \text{ و } 14 . ۴$$

$$63 \text{ و } 14 . ۳$$

$$21 \text{ و } 12 . ۲$$

$$21 \text{ و } 14 . ۱$$

-۲۰ جدول توزیع احتمال زیر را در نظر بگیرید واریانس X کدام است؟

X	-1	1	2
$P(x)$	0.2	0.3	0.5

$$1.29 . ۴$$

$$1.4 . ۳$$

$$1.45 . ۲$$

$$1.8 . ۱$$

-۴۱- اگر متغیر تصادفی X دارای توزیع دو جمله‌ای با پارامترهای $n=3$ ، $p=0.7$ باشد $P(X=0)$ کدام است؟

.۰۹ .۴

.۰۲۷ .۳

.۰۲۷ .۲

.۰۹ .۱

-۴۲- در کدام توزیع میانگین و انحراف معیار با هم برابرند؟

.۴ نرمال

.۳ دو جمله‌ای

.۲ پواسن

.۱ نمایی

-۴۳- دانشجویی به ۱۰ سوال چهار گزینه‌ای پاسخ می‌دهد. احتمال درست به هر سوال ۰.۲۵ است. میانگین تعداد پاسخ‌های درست چقدر است؟

.۳۵ .۴

.۲۵ .۳

.۲ .۲

.۳ .۱

-۴۴- از بین ۸ مدیری که به جلسه‌ای دعوت شده اند ۳ نفرشان شرکت نمی‌کنند اگر به تصادف ۴ مدیر انتخاب کنیم احتمال اینکه ۲ مدیر شرکت نکردند باشند چقدر است؟

$\frac{3}{14} .۴$

$\frac{30}{70} .۳$

$\frac{17}{70} .۲$

$\frac{9}{14} .۱$

-۴۵- از بین ۸ مدیری که به جلسه‌ای دعوت شده اند ۳ نفرشان شرکت نمی‌کنند اگر به تصادف ۴ مدیر انتخاب کنیم، میانگین تعداد مدیران که در جلسه شرکت نمی‌کنند چقدر است؟ www.nashr-estekhdam.ir

.۳ .۴

.۲ .۳

.۱۵ .۲

.۲۵ .۱

-۴۶- بطور متوسط با توزیع پواسن در هر ساعت ۱۲ اتومبیل وارد پمپ بنزین می‌شوند. احتمال اینکه در ۱۵ دقیقه ۲ اتومبیل وارد شوند چقدر است؟

$e^{-3} .۳ .۴$

$4.5e^{-3} .۳ .۳$

$e^{-3} .۲ .۲$

$12e^{-3} .۱ .۱$

-۴۷- سود شرکتی دارای توزیع یکنواخت بین ۶ و ۱ است. متوسط سود مورد انتظار چقدر است؟

.۳ .۴

.۲ .۳

.۲۵ .۲

.۳۵ .۱

-۴۸- مدت تعمیر ماشینی بر اساس توزیع نمایی با میانگین ۱ ساعت است. احتمال اینکه مدت تعمیر دستگاهی کمتر از ۲ ساعت باشد چقدر است؟

$e^{-2} .۴ .۴$

$1 - e^{-2} .۳ .۳$

$e^{-1} .۲ .۲$

$1 - e^{-1} .۱ .۱$

-۴۹- اگر X متغیر تصادفی پیوسته باشد کدام گزینه نادرست است؟

$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) \quad .\cdot 2$$

$$P(X \leq a) = 1 - P(X < a) \quad .\cdot 1$$

$$P(X = a) = 0 \quad .\cdot 4$$

$$P(X \leq a) = P(X < a) \quad .\cdot 3$$

-۵۰- سن کارگران کارخانه ای دارای توزیع نرمال با میانگین ۳۵ و انحراف معیار ۱۰ سال است. اگر افراد بیش از ۵۵ سال

$$P(0 \leq Z \leq 2) = 0.4772 \quad \text{بازنیسته شوند، چند درصد از کارگران بازنیسته خواهند شد؟}$$

.۰/۰۲۲۸ .۴

.۰/۱۲۲۸ .۳

.۰/۴۷۷۲ .۲

.۰/۹۷۷۲ .۱

-۵۱- اگر X متغیر تصادفی دارای توزیع نرمال با میانگین ۱۵ و واریانس ۲۵ باشد، مقدار استاندارد شده $X=10$ کدام است؟

.-۰/۵ .۴

.۰/۵ .۳

.۱ .۲

.-۱ .۱

$$P(-1 \leq Z \leq 0.5) = P(0 \leq Z \leq 0.5) = 0.1915 \quad , \quad P(0 \leq Z \leq 1) = 0.3413 \quad -۵۲$$

چقدر است؟

.۰/۸۵۰۲ .۴

.۰/۴۶۷۲ .۳

.۰/۵۳۲۸ .۲

.۰/۱۴۹۸ .۱

www.nashr-estekhdam.ir

-۵۳- واریانس جامعه ای برابر ۸۱ است. برای نمونه تصادفی به اندازه ۳۶ انحراف معیار میانگین نمونه چقدر است؟

$\frac{81}{6} .\cdot 4$

$\frac{1}{4} .\cdot 3$

$\frac{3}{2} .\cdot 2$

$\frac{9}{4} .\cdot 1$

-۵۴- درصد کارمندان سازمانی مرد هستند. در یک نمونه تصادفی ۱۵۰ نفره واریانس نسبت نمونه ای \bar{P} کدام است؟

.۰/۰۳۷ .۴

.۰/۰۰۳ .۳

.۰/۰۱۴ .۲

.۰/۰۳۷۴ .۱

-۵۵- کدام مقیاس دارای ویژگیهای بهتری برای اندازه گیری است؟

۴. اسمی

۳. نسبتی

۲. رتبه ای

۱. فاصله ای

1	د
2	ب.
3	ج
4	ب.
5	د
6	الف
7	ب.
8	الف
9	ج
10	ج
11	د
12	ج
13	الف
14	الف
15	ب.
16	د
17	الف
18	ج
19	ب.
20	د

- کدام مقیاس برای متغیر های کیفی به کار می رود؟

۴. نسبی

۳. فاصله ای

۲. ترتیبی

۱. اسمی

-۲- اگر دامنه تغییرات ۳۰ و طول دسته ۵ باشد، آنگاه داده ها را در چند گروه دسته بندی کنیم؟

۸ . ۴

۷ . ۳

۶ . ۲

۵ . ۱

-۳- اگر کوچکترین داده ۱۲ و بزرگترین ۴۸ باشد و تعداد دسته ها را هم ۴ برگزینیم در این صورت طول دسته ها چقدر است؟

۱۲ . ۴

۸ . ۳

۹ . ۲

۱۰ . ۱

-۴- اگر ۴۷ عدد داشته باشیم عدد چند میانه است؟

۳۰ . ۴

۲۴ . ۳

۲۳ . ۲

۲۱ . ۱

-۵- ابتدا جدول زیر را کامل سپس به سوالات زیر پاسخ دهید:

دسته ها	فرآوانی	فرآوانی تجمعی
۱۰-۰		
۲۰-۱۰	۸	۱۵
۳۰-۲۰	۴	
۴۰-۳۰		۲۵

www.nashr-estekhdam.ir

میانگین چقدر است؟

۱۲/۶۳ . ۴

۲۵/۸۴ . ۳

۱۶/۸۵ . ۲

۱۸/۶ . ۱

دسته ها	فراوانی
۸-۰	۵
۱۶-۸	۲
۲۴-۱۶	۸
۳۲-۲۴	۱۰

www.nashr-estekhdam.ir

-۶ ابتدا جدول زیر را کامل سپس به سؤالات زیر پاسخ دهید:

دسته ها	فراوانی	فراوانی تجمعی
۱۰-۰		
۲۰-۱۰	۸	۱۵
۳۰-۲۰	۴	
۴۰-۳۰		۲۵

میانه داده ها چقدر است؟

۱۶/۹ . ۴

۲۸ . ۳

۲۰/۵ . ۲

۲۲/۵ . ۱

-۷ ابتدا جدول زیر را کامل سپس به سؤالات زیر پاسخ دهید:

دسته ها	فراوانی	فراوانی تجمعی
۱۰-۰		
۲۰-۱۰	۸	۱۵
۳۰-۲۰	۴	
۴۰-۳۰		۲۵

مد داده ها چقدر است؟

۲۰ . ۴

۱۵ . ۳

۵ . ۲

۱۰ . ۱

-۸- ابتدا جدول زیر را کامل سپس به سئوالات زیر پاسخ دهید:

دسته ها	فراوانی	فراوانی تجمعی
۱۰-۰		
۲۰-۱۰	۸	۱۵
۳۰-۲۰	۴	
۴۰-۳۰		۲۵

چند درصد اعداد کمتر از ۲۰ هستند؟

۶۰ . ۴

۳۲ . ۳

۵۰ . ۲

۴۰ . ۱

-۹- ابتدا جدول زیر را کامل سپس به سئوالات زیر پاسخ دهید:

دسته ها	فراوانی	فراوانی تجمعی
۱۰-۰		
۲۰-۱۰	۸	۱۵
۳۰-۲۰	۴	
۴۰-۳۰		۲۵

www.nashr-estekhdam.ir

واریانس نمونه ای چقدر است؟

۹۲/۴۱ . ۴

۹۰/۲۱ . ۳

۱۳۲/۳۳ . ۲

۷۸/۶۲ . ۱

-۱۰- ابتدا جدول زیر را کامل سپس به سئوالات زیر پاسخ دهید:

دسته ها	فراوانی	فراوانی تجمعی
۱۰-۰		
۲۰-۱۰	۸	۱۵
۳۰-۲۰	۴	
۴۰-۳۰		۲۵

قطاع دسته دوم در نمودار دایره ای چقدر است؟

۳۸/۸ . ۴

۲۵/۸ . ۳

۳۵/۲۸ . ۲

۱۱۵/۲ . ۱

۱۱- ابتدا جدول زیر را کامل سپس به سئوالات زیر پاسخ دهید:

دسته ها	فراوانی	فراوانی تجمعی
۱۰-۰		
۲۰-۱۰	۸	۱۵
۳۰-۲۰	۴	
۴۰-۳۰		۲۵

چارک اول چقدر است؟

۱۱ . ۴

۸/۹۳ . ۳

۱۵ . ۲

۱۷ . ۱

۱۲- ابتدا جدول زیر را کامل سپس به سئوالات زیر پاسخ دهید:

دسته ها	فراوانی	فراوانی تجمعی
۱۰-۰		
۲۰-۱۰	۸	۱۵
۳۰-۲۰	۴	
۴۰-۳۰		۲۵

دهک هفتم چقدر است؟

۳۴ . ۴

۳۲ . ۳

۲۶/۲۵ . ۲

۲۴ . ۱

www.nashr-estekhdam.ir

اگر اعداد ۱۰ و ۵ و ۴ را داشته باشیم میانگین همساز چقدر است؟

۲/۳۶ . ۴

۲/۲۴ . ۳

۳/۸۴ . ۲

۱/۶۳ . ۱

۱۴- در اعداد ۱۰ و ۹ و ۶ میانگین هندسی چقدر است؟

۲ . ۴

۳ . ۳

۵ . ۲

۹ . ۱

۱۵- اگر در داده هایی میانگین ۱۸ و میانه ۱۶ باشد و همچنین واریانس ۴ بدست آید ضریب چولگی چقدر است؟

۱/۵ . ۴

۱ . ۳

۳ . ۲

۱/۷۵ . ۱

۱۶- به چند طریق می توان از ۹ نفر ۳ نفر را انتخاب کرد؟

۸۱ . ۴

۲۷ . ۳

۸۴ . ۲

۹۲ . ۱

$$5^4 \times 4 \quad .\ .\ .\ .$$

$$5^4 \quad .\ .\ .\ .$$

$$4^5 \quad .\ .\ .\ .$$

$$20 \quad .\ .\ .\ .$$

۱۸- اگر اعداد ۱ و ۲ و ۵ و ۶ را داشته باشیم و با آنها اعداد دو رقمی بدون تکرار بنویسیم احتمال اینکه عدد نوشته شده زوج باشد چقدر است؟

$$\frac{3}{12} \quad .\ .$$

$$\frac{1}{2} \quad .\ .$$

$$\frac{1}{12} \quad .\ .$$

$$\frac{2}{5} \quad .\ .$$

۱۹- اگر سه سکه را پرتاب کنیم احتمال اینکه هر سه شیر بباید چقدر است؟

$$\frac{1}{2} \quad .\ .$$

$$\frac{1}{8} \quad .\ .$$

$$\frac{3}{8} \quad .\ .$$

$$\frac{2}{8} \quad .\ .$$

۲۰- اگر دو تاس را پرتاب کنیم احتمال اینکه هر دو تاس یک عدد بباید چقدر است؟

$$\frac{2}{7} \quad .\ .$$

$$\frac{1}{2} \quad .\ .$$

$$\frac{1}{6} \quad .\ .$$

$$\frac{1}{3} \quad .\ .$$

۲۱- شرط ناسازگاری کدام است؟

$$A \cup B = 0 \quad .\ .$$

$$A \cup B = \emptyset \quad .\ .$$

$$A \cap B = \emptyset \quad .\ .$$

$$A \cap B = 0 \quad .\ .$$

۲۲- تاسی را پرتاب می کنیم اگر بدانیم وجه بزرگتر از ۴ می آید احتمال اینکه ۵ بباید چقدر است؟

$$1 \quad .\ .$$

$$\frac{2}{5} \quad .\ .$$

$$\frac{1}{3} \quad .\ .$$

$$\frac{1}{2} \quad .\ .$$

www.nashr-estekhdam.ir

۲۳- اگر دو پیشامد A,B مستقل باشند کدام رابطه درست است؟

$$p(A \cup B) = p(A)p(B) \quad .\ .$$

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) \quad .\ .$$

$$p(A|B) = p(B) \quad .\ .$$

$$p(A|B) = p(A) \quad .\ .$$

-۲۴- اگر جدول احتمال زیر را داشته باشیم:

x	*	۱	۳	۵
p	۰/۱	۲k	۰/۲	۳k

مقدار k چقدر است؟

۵. ۴

$$\frac{2}{7} \cdot ۳$$

$$\frac{7}{50} \cdot ۲$$

$$\frac{7}{5} \cdot ۱$$

-۲۵- اگر جدول احتمال زیر را داشته باشیم:

x	*	۱	۳	۵
p	۰/۱	۲k	۰/۲	۳k

مقدار امید ریاضی چقدر است؟

۳/۱۵ . ۴

۲/۹۸ . ۳

۱/۸۵ . ۲

۱/۷۸ . ۱

-۲۶- ۵ مزرعه داریم که در ۳ تای آنها گندم و در ۲ تای آنها جو کاشته می شود ۲ مزرعه به تصادف انتخاب می کنیم. احتمال اینکه هر دو مزرعه جو باشد؟

www.nashr-estekhdam.ir

۰/۵ . ۴

۰/۳ . ۳

۰/۲ . ۲

۰/۱ . ۱

-۲۷- ۵ مزرعه داریم که در ۳ تای آنها گندم و در ۲ تای آنها جو کاشته می شود ۲ مزرعه به تصادف انتخاب می کنیم. احتمال اینکه یکی جو و دیگری گندم باشد؟

۰/۷ . ۴

۰/۶ . ۳

۰/۵ . ۲

۰/۴ . ۱

-۲۸- در کدام توزیع میانگین با واریانس برابر است؟

۴. هیچکدام

۳. نرمال

۲. پواسن

۱. دو جمله ای

-۲۹- در توزیع دو جمله ای با $n=8, p=\frac{1}{2}$ امید ریاضی و واریانس چقدر است؟

۴۱۰ . ۴

۲۹۲ . ۳

۴۰۴ . ۲

۲۹۴ . ۱

۳۰- اگر تعداد خودروهای احتمال اینکه در یک ساعت با مقدار ۳ در ساعت توزیع پواسن باشد. احتمال اینکه در یک ساعت

۲ خودرو وارد این پارکینگ شود چقدر است؟

www.nashr-estekhdam.ir

$$4e^{-6} \cdot t^3$$

$$4e^{-3} \cdot t$$

$$4.5e^{-3} \cdot t$$

1	الف
2	ج
3	د
4	الف
5	بـ.
6	ج
7	د
8	الف
9	ج
10	الف
11	بـ.
12	الف
13	د
14	د
15	ج
16	الف
17	ج
18	بـ.
19	بـ.
20	د
21	الف
22	ج
23	بـ.
24	د
25	ج
26	الف
27	ج
28	د
29	بـ.
30	بـ.

- گروه خونی دانشجویان از چه مقیاسی پیروی میکند؟

- | | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|
| ۱. اسمی | ۲. ترتیبی | ۳. فاصله ای | ۴. نسبتی |
| ۱. جامعه | ۲. نمونه | ۳. عنصر | ۴. متغیر |

- آمار به تجزیه و تحلیل میپردازد؟

- | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| ۱. ۶۹۹۸۷۰ | ۲. ۶۹۰۶۸۰ | ۳. ۹۹۸۷۰۶ | ۴. ۶۹۰۶۸۰۶۷۰ |
| ۴. در داده های ۱۰، ۱۲، ۱۰، ۱۶، ۲۰، ۱۸ | ۵. نمودار ساقه و برگ | ۶. معروف چه اعدادی است؟ | ۷. ۹۹۸۷۰۶ |
| ۸. ۱۰ | ۹. ۶۹۰۶۸۰ | ۱۰. ۶۹۹۸۷۰ | ۱۱. ۶۹۰۶۸۰۶۷۰ |

- | | | | |
|---|------------------------------|--------|---------|
| ۱. فراوانی در صد رده ۳۱-۲۴/۹ برابر ۳۱/۲۵ و $n = 80$ است. | ۲. فراوانی رده فوق چقدر است؟ | ۳. ۵۵ | ۴. ۲۴ |
| ۴. ۳۱/۲۵ | ۵. ۲۵ | ۶. ۲ | ۷. ۱۰ |
| ۸. اگر فراوانی نسبی داده ای ۳۵/۰ باشد، اندازه زاویه مرکزی قطاع مربوط به آن در نمودار دایره ای چقدر است؟ | ۹. ۳۶۰ | ۱۰. ۳۵ | ۱۱. ۲۳۴ |

www.nashr-estekhdam.ir

- میانگین داده های جدول فراوانی زیر چقدر است؟

نماينده رده	۲	۶	۱۰	۱۴
فراوانی	۳	۵	۲	۱

- | | | | |
|-------|---------|---------|---------|
| ۱. ۱۱ | ۲. ۱۷/۵ | ۳. ۲/۷۵ | ۴. ۶/۳۶ |
|-------|---------|---------|---------|

- میانه داده های ۷/۸، ۳/۲، ۷، ۱۲، ۴/۵، ۶ کدام است؟

- | | | | |
|--------|--------|------|---------|
| ۱. ۶/۵ | ۲. ۴/۵ | ۳. ۶ | ۴. ۵/۲۵ |
|--------|--------|------|---------|

- در جدول فراوانی زیر مقدار میانه چقدر است؟

حدود رده ها	۲۴-۲۰	۲۹-۲۵	۳۴-۳۰	۳۹-۳۵
فراوانی	۱۲	۲۲	۱۰	۱۶

- | | | | |
|-------|---------|----------|-------|
| ۱. ۳۰ | ۲. ۲۴/۵ | ۳. ۲۸/۵۹ | ۴. ۱۶ |
|-------|---------|----------|-------|

-۱۰- مددادهای ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ کدام است؟

۱. ۴

۳. ۳

۶. ۲

۵. ۱

-۱۱- اگر سرعت اتومبیل در ساعت اول ۴۸ کیلومتر در ساعت و در ساعت دوم ۸۰ کیلومتر در ساعت باشد، آنگاه میانگین سرعت چقدر است؟

۳۲. ۴

۱۲۸. ۳

۶۰. ۲

۶۴. ۱

-۱۲- انحراف معیار دادهای ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۳ چقدر است؟

۳. ۴

۱۳. ۳

۰/۶۷. ۲

۰/۸۱۶. ۱

-۱۳- اگر $n = ۵$, $\sum x_i = ۷۴.۱$, $\sum x_i^2 = ۱۲۰۳.۹$ ۷ مقدار واریانس دادهها چقدر است؟

۲۶/۴۵. ۴

۲۵. ۳

۵/۱۴. ۲

۱۴/۸۲. ۱

-۱۴- اگر $s = ۰.۵۵$, $\bar{x} = ۱۹.۰۳$, $\tilde{x} = ۱۸.۸۵$ ضریب چولگی پیرسون تقریباً چقدر است؟

-۰/۱. ۴

۰/۱. ۳

-۰/۳. ۲

۰/۳. ۱

-۱۵- با توجه به جدول فراوانی زیر مقدار چارک سوم چقدر است؟

www.nashr-estekhdam.ir

حدود ۵۵	۴-۰	۹-۵	۱۴-۱۰	۱۹-۱۵	۲۴-۲۰
فراوانی	۱۸	۱۵	۹	۷	۱

۳/۵. ۴

۱۲. ۳

۹/۵. ۲

۳۷/۵. ۱

-۱۶- سکه ای سالم را دو بار پرتاب میکنیم. احتمال اینکه حداقل یک شیر ظاهر شود چقدر است؟

۱. ۴

۰/۵. ۳

۰/۲۵. ۲

۰/۷۵. ۱

-۱۷- یک تاس سالم را دو بار پرتاب میکنیم. احتمال اینکه مجموع دو شماره حداقل ۱۰ باشد چقدر است؟

$\frac{5}{6}. ۴$

$\frac{1}{6}. ۳$

$\frac{1}{4}. ۲$

$\frac{1}{9}. ۱$

-۱۸- فرض کنید $P(A \cap B) = \frac{1}{2}$, $P(A) = \frac{4}{36}$, $P(B) = \frac{6}{36}$ آنگاه $P(A|B)$ چقدر است؟

$\frac{2}{3}. ۴$

$\frac{8}{36}. ۳$

$\frac{3}{36}. ۲$

$\frac{2}{36}. ۱$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad .\text{۲}$$

$$P(A \cap B) = P(A).P(B) \quad .\text{۱}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad .\text{۴}$$

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) \quad .\text{۳}$$

-۲۰- با ارقام ۴، ۳، ۲، ۱، ۰ چند عدد دو رقمی میتوان نوشت؟ (تکرار ارقام مجاز است)

۲۰. ۴

۳۲. ۳

۵. ۲

۲۵. ۱

-۲۱- به چند طریق میتوان یک کمیته ۴ نفری از بین ۱۰ نفر انتخاب کرد؟

۱۰۰۰۰. ۴

۵۰۴۰. ۳

۴۰. ۲

۲۱۰. ۱

-۲۲- سکه ای سالم را ۳ بار پرتاب میکنیم. اگر X تعداد شیرهای ظاهر شده در ۳ بار پرتاب سکه باشد ($P(X = ۲)$ چقدر است؟

 $\frac{1}{2} .\text{۴}$ $\frac{3}{8} .\text{۳}$ $\frac{2}{8} .\text{۲}$ $\frac{1}{8} .\text{۱}$

-۲۳- از بین ۵ مزرعه کشاورزی که در ۳ مزرعه گندم و در ۲ مزرعه دیگر جو کاشته شده است ، ۲ مزرعه را به تصادف انتخاب میکنیم. احتمال اینکه در یک مزرعه گندم کاشته شده باشد چقدر است؟

۰/۷. ۴

۰/۳. ۳

۰/۶. ۲

۰/۱. ۱

www.nashr-estekhdam.ir

-۲۴- در جدول توزیع احتمال زیر مقدار k چقدر است؟

x	۰	۱	۲	۳
$f(x)$	۰/۲	k	۰/۲۵	۰/۳

۰/۲۵. ۴

۰/۰۲۵. ۳

۰/۷۵. ۲

۰. ۱

-۲۵- در جدول توزیع احتمال زیر میانگین X چقدر است؟

x	-۱	۰	۱
$f(x)$	۰/۲	۰/۳	۰/۵

۰/۶. ۴

۰/۳. ۳

۰/۷. ۲

۱. ۱

-۲۶ اگر X مقدار واریانس $\sum xf(x) = 7$, $\sum x^2 f(x) = \frac{329}{6}$ چقدر است؟

$$\frac{623}{6} . ٤$$

$$\frac{287}{6} . ٣$$

$$\sqrt{\frac{35}{6}} . ٢$$

$$\frac{35}{6} . ١$$

-۲۷ در یک امتحان تستی که در آن ۲۰ سوال چهار گزینه‌ای داده شده است، دانشجویی همه سوالها را شансی جواب میدهد. این دانشجو به طور متوسط چند سوال را جواب درست میدهد؟

$$٣/٧٥ . ٤$$

$$٥ . ٣$$

$$١٥ . ٢$$

$$٢٠ . ١$$

www.nashr-estekhdam.ir

-۲۸ در توزیع دوجمله‌ای انحراف معیار X کدام است؟

$$\sqrt{npq} . ٤$$

$$npq . ٣$$

$$nq . ٢$$

$$np . ١$$

-۲۹ در کدام توزیع میانگین و واریانس با هم برابر هستند؟

$$٤. خی دو$$

$$٣. نرمال$$

$$٢. پواسن$$

$$١. دوجمله‌ای$$

-۳۰ اگر X دارای توزیع نرمال با میانگین ۲ و انحراف معیار ۱/۵ باشد مقدار $P(3.1 < X < ۵.۵)$ چقدر است؟

$$٠/٧٦٦٥ . ٤$$

$$٠/٢٧٦٤ . ٣$$

$$٠/٢١٣٧ . ٢$$

$$٠/٤٩٠١ . ١$$

١	الف
٢	ج
٣	ج
٤	ج
٥	الف
٦	د
٧	ج
٨	د
٩	ج
١٠	الف
١١	ج
١٢	ج
١٣	ج
١٤	ج
١٥	ج
١٦	ج
١٧	ج
١٨	ج
١٩	ج
٢٠	ج
٢١	ج
٢٢	الف
٢٣	ج
٢٤	ج
٢٥	ج
٢٦	الف
٢٧	ج
٢٨	ج
٢٩	الف
٣٠	ج

$$\log_2 \frac{2^{100}}{32} = 1$$

۲۰۰ . ۴

۹۹۵ . ۳

۱۰۰۰ . ۲

۵ . ۱

-۴- آنتی لگاریتم $0/3729$ برابر است با:

$0/137 . ۴$

$1/37 . ۳$

$0/233 . ۲$

$2/36 . ۱$

www.nashr-estekhdam.ir

-۳- در جدول زیر تعداد کل داده ها 120 است، مقدار a برابر است با:

دسته	فراوانی	فراوانی نسبی	فراوانی تجمعی
۳-۱	۱۵		
۶-۴		$0/5$	
۹-۷	a		
۱۲-۱۰	۱۵		

۳۰ . ۴

$0/25 . ۳$

۲۰ . ۲

۱۵ . ۱

-۴- در جدول زیر تعداد خانواده ها بر حسب میزان درآمد مشخص شده اند. دولت اعلام نموده تنها خانوارهای زیر سطح درآمد $2000,000$ تومان شامل یارانه میگردند، بر این اساس چند درصد خانوارها شامل یارانه خواهند شد؟

سطح درآمد	فراوانی
زیر $500,000$ تومان	$230,000$
$1000,000-500,000$	$50,000$
$2000,000-1000,000$	$120,000$
$3000,000-2000,000$	$23,000$
به بالا $3000,000$	$190,000$

$780 . ۴$

$765 . ۳$

$760 . ۲$

$750 . ۱$

۵- میانگین درس آمار یک کلاس ۳۰ نفری ۱۵ میباشد، استاد درس بعداً متوجه میشود نمره یکی از دانشجویان با نمره ۱۲ را وارد نکرده است، میانگین نمرات کلاس پس از وارد نمودن نمره این دانشجو برابر است با؟

۴. اطلاعات کافی نیست

۱۴۹ . ۳

۱۴ . ۲

۱۵ . ۱

۶- اگر امتحان پایان ترم درس آمار ۳ برابر وزن یک آزمون آن باشد، در صورتی که دانشجویی نمره پایان ترم ۸۵ و نمرات آزمون ۷۰ و ۹۰ را کسب نماید، میانگین نمرات او برابر است با:

۸۳ . ۴

۷۵ . ۳

۸۵ . ۲

۸۰ . ۱

۷- کدام مقدار تحت تأثیر داده های بیش از اندازه بزرگ یا کوچک قرار نمی گیرد؟

۴. میانه

۳. انحراف معیار

۲. واریانس

۱. میانگین

۸- در داده های زیر میانه برابر است با:

دسته	فرآوانی
۱۲۶-۱۱۸	۳
۱۳۵-۱۲۷	۵
۱۴۴-۱۳۶	۹
۱۵۳-۱۴۵	۱۲
۱۶۲-۱۵۴	۵
۱۷۱-۱۶۳	۴
۱۸۰-۱۷۲	۲

www.nashr-estekhdam.ir

۱۴۶/۸ . ۴

۱۴۰/۴ . ۳

۱۴۸/۹ . ۲

۱۳۶/۷ . ۱

۹- در صورتی که وواریانس عدد X برابر ۴ باشد واریانس عدد $6X + 4$ - برابر است با:

-۱۴۴ . ۴

۱۴۴ . ۳

۲۴ . ۲

-۲۴ . ۱

-۱۰- ضریب گشتاوری کشیدگی برابر است با:

$$\frac{m_4}{m_2} \quad .4$$

$$\frac{m_4}{m_2^2} \quad .3$$

$$\frac{m_2^2}{m_4} \quad .2$$

$$\frac{m_2}{m_4} \quad .1$$

-۱۱- مقدار m_1 برای $X_{1,\dots,n}$ برابر است با:

.۴ واریانس

.۳ میانگین

.۲ .

.۱ .

-۱۲- اگر E_1 و E_2 دو واقعه مانعه الجمع باشند آنگاه کدام گزینه صحیح است؟

$$P(E_1E_2) = P(E_2) \quad .2$$

$$P(E_1E_2) = P(E_1) \quad .1$$

$$P(E_1E_2) = 0 \quad .4$$

$$P(E_1E_2) = 1 \quad .3$$

-۱۳- در پرتاب یک تاس سالم امید ریاضی برابر است با:

$$\frac{1}{2} \quad .4$$

$$\frac{1}{6} \quad .3$$

$$\frac{7}{2} \quad .2$$

$$3 \quad .1$$

www.nashr-estekhdam.ir

-۱۴- اگر ترکیب P_3^n برابر ۲۴ باشد آنگاه ترتیب $\binom{n}{3}$ برابر است با:

$$180 \quad .4$$

$$24 \quad .3$$

$$4 \quad .2$$

$$144 \quad .1$$

-۱۵- به چند طریق ۵ نفر میتوانند روی یک نیمکت که تنها ۳ نفر جا دارد بنشینند؟ (هر صندلی یک نفر)

$$40 \quad .4$$

$$120 \quad .3$$

$$60 \quad .2$$

$$10 \quad .1$$

-۱۶- احتمال سقوط هواپیما $2/0$ است، احتمال اینکه در ۱۰ پرواز هواپیما سقوط نکند برابر است با:

$$0/2^{10} \times 10 \quad .4$$

$$0/8^{10} \times 10 \quad .3$$

$$0/8^{10} \quad .2$$

$$0/2^{10} \quad .1$$

۱۷- اگر $P(-2/1 < z < 0/3)$ باشد آنگاه مقدار $P(-0/3 < z < 0) = 0/12$ و $P(0 < z < 2/1) = 0/48$

برابر است با:

-۰/۶ . ۴

۰/۶ . ۳

-۰/۳۶ . ۲

۰/۳۶ . ۱

۱۸- ناسی ۱۲۰ بار پرتاب میشود، نمره استاندارد عدد ۴ برابر است با:

$1/6\sqrt{6}$. ۴

$16\sqrt{6}$. ۳

$-1/6\sqrt{6}$. ۲

۰ . ۰

۱۹- در صورتی که ۳ درصد لامپ های یک کارخانه معیوب باشد، احتمال اینکه در یک نمونه ۱۰۰ تایی هیچ لامپ معیوبی دیده نشود برابر است با:

$1 - e^3$. ۴

e^3 . ۳

e^{-3} . ۲

$1 - e^{-3}$. ۱

۲۰- در فرمول واریانس مشترک در حالتی که $n_1 = n_2$ باشد، $s^2 p$ (واریانس مشترک) برابر است با:

$\frac{(n)(s_1^2 + s_2^2)}{2}$. ۴

$\frac{(n)(s_1^2 - s_2^2)}{2}$. ۳

$\frac{s_1^2 - s_2^2}{2}$. ۲

$\frac{s_1^2 + s_2^2}{2}$. ۱

۲۱- دانشگاه پیام نور ادعا میکند میانگین نمره درس آمار در رشته کشاورزی (۴۰ از نمره ۱۰۰) میباشد، از میان یک نمونه ۱۸ نفری اطلاعات زیر حاصل شد، آماره آزمون برابر است با:

www.nashr-estekhdam.ir

$$\sum X_i = 669/7$$

$$\sum X_i^2 = 24927/33$$

-۱۴/۸۹ . ۴

۱۴ . ۳

۱۱ . ۲

-۱۰/۸۵ . ۱

۲۲- اشتباه نوع اول برابر است با:

۲. رد فرض صفر وقتی صحیح است.

۴. رد فرض صفر وقتی غلط است.

۱. همان اشتباه نوع دوم است.

۳. پذیرش فرض صفر وقتی غلط است.

-۴۳ درجه آزادی برابر است با:

۱. تعداد مشاهدات نمونه
۲. تعداد جامعه
۳. تعداد مشاهدات مستقل در یک دسته
۴. مقدار آماره آزمون

-۴۴ در آزمونهای میانگین رد کردن فرض H_0 به معنیاست.

۱. اختلاف معنی دار نیست.
۲. میانگین نمونه بزرگتر از میانگین جامعه است.
۳. میانگین نمونه کوچکتر از میانگین جامعه است.

-۴۵ دردو نمونه با حجم یکسان n برای آزمون آماره آزمون دارای $\begin{cases} H_0: \mu_1 = \mu_2 \\ H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases}$ توزیع.....است.

۱. t با $2(n-1)$ درجه آزادی
۲. χ^2 با $(n-2)$ درجه آزادی

www.nashr-estekhdam.ir

-۴۶ یک آزمون یک دامنه کی دو متراffد با یک آزموناست.

۱. یک دامنه Z
۲. دو دامنه Z
۳. با یک درجه آزادی t
۴. با دو درجه آزادی t

-۴۷ در آزمون واریانس جامعه در جامعه ای به حجم ۱۸ از آزموناستفاده می گردد.

۱. با ۱۶ درجه آزادی t
۲. با ۱۷ درجه آزادی t
۳. کی دو با ۱۷ درجه آزادی t
۴. کی دو با ۱۶ درجه آزادی t

۴۸- فراوانی های مشاهده شده در جدول زیر آمده است، برای بررسی متعادل بودن تاس مقدار آماره آزمون برابر است با:

۱	۲	۳	۴	۵	۶
۲۵	۱۷	۱۵	۲۳	۲۴	۱۶

www.nashr-estekhdam.ir

.۴ / ۵

.۳ / ۵

.۲ / ۲۵

.۱ .۰

۴۹- در آزمون فرض برابری نسبت قبول شدگان کنکور ۹۳ در سه شهر شیراز، اصفهان و تهران درجه آزادی آزمون برابر است با:

۴. اطلاعات کافی نیست

.۳ .۲

.۲ .۱

.۱ .۳

۵۰- اگر امتحان آخر یک درس ۳ برابر وزن یک آزمون باشدو دانشجویی دارای نمره آخر ۸۵ و نمرات آزمون ۷۰ و ۹۰ باشد، میانگین نمره او برابر است با:

.۴ / ۷۰

.۳ / ۳۸

.۲ / ۸۰

.۱ / ۸۳

١	ج
٢	الف
٣	د
٤	ج
٥	ج
٦	د
٧	د
٨	د
٩	ج
١٠	ج
١١	بـ
١٢	د
١٣	بـ
١٤	الف
١٥	الف، بـ
١٦	بـ
١٧	ج
١٨	بـ
١٩	بـ
٢٠	الف
٢١	د
٢٢	بـ
٢٣	ج
٢٤	الف
٢٥	الف
٢٦	بـ
٢٧	د
٢٨	ج
٢٩	ج
٣٠	الف